

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

普濟方卷一百

六十九
七十

詳校官太醫院醫士_臣舒岱

編修_臣倉聖脈覆勘

總校官庶吉士_臣何思鈞

校對官典簿_臣劉景岳

謄錄監生_臣鄧捷成

欽定四庫全書卷

普濟方卷一百六十九 明 周王朱橚 撰

積聚門

積聚

消積丹 治婦人男子一切冷積

青皮 一錢半 陳皮 一錢半 葫蘆芭 故紙 京三稜

白牽牛 黑牽牛 各三錢

右用巴豆二十粒大棗二十枚去核巴豆去皮每棗

一箇包巴豆一箇用紙裹定泥包成箇燒餅文武火
燒乾取出將前項藥同燒乾棗豆為細末又用白麵
四兩包藥成大燒餅燒乾同藥研為細末醋糊為丸
如桐子大每服五七丸至九九空吃醋湯下

木香丸

出聖濟
總錄

治冷積滯氣心胃痞悶令氣上攻臍臍

疼痛

木香

桂

去粗
皮

京三稜

煨
剉

蓬莪茂

煨
剉

胡椒

炒

青橘

皮

去白
焙
各一兩

檳榔

剉

訶黎勒

煨
剉
核

大黃

剉
炒
各
兩半

白牽

牛

炒二兩取
末半兩

右為細末醋煮麴糊為丸如菉豆大每服七丸至十丸食後生薑湯下

金華散 治遠年沉積酒食過多生冷所傷驚憂聚結不散胃膈膨悶脇肋堅痛肌瘦減食時發寒熱夜多盜汗身體俱黃四肢浮腫痰涎壅盛咳嗽胃滿嘔逆惡心臟腑虛弱臍腹刺痛傷滑下利膿血瘡癩不服水土及婦人經候不調

大黃

三十兩

瞿麥

淨十兩

京三稜

枳櫛

茴香

各五錢

黃芩

木香

各四兩

右為細末用白麵一斤和藥勻水搜作十餘餅微亮乾用猛火焙一夜極乾又為末入木香每服三錢臨睡服用酒調下至五更時取惡物更以溫粥補之

磨積丸

出聖濟總錄

治積聚不消果有傷滯食已腹痛飲食

不化惡心嘔吐胃脇脹悶大便秘利不定

木香

青橘皮

湯浸去白焙

桂

去粗皮各一兩

吳茱萸

湯洗焙乾炒三

兩 礪砂 醋煮成霜 巴豆霜 半錢

研末一錢

右搗羅四味為細末入礪砂巴豆霜拌勻醋煮麵糊丸如菉豆大每服三丸至五丸早晚食後臨卧服大便澹利即減丸數

鰲甲挑仁煎丸 治諸候

桃仁

五兩湯浸去皮尖用水研濾取三升

京三稜

二兩根黃

鰲甲

九錢煮醋炙黃

三 栝榔

青橘皮

去瓢炒

木香

各一兩

右先取桃仁汁慢火熬至二升同加好醋一升再熬

如糊將餘藥五味細末拌勻丸如桐子大每服五七

十丸淡醋湯下空心日二服

青金膏

信香十方青金膏灌頂大法王子所傳十二上願藥師琉璃光如來應供正偏知明行足善逝

世間解無上士調衛文夫天人師佛世尊方境授

治周身中外陰陽不調氣

血不調變生百病乃至虛羸困倦徧攻酒食內傷心

腹滿塞急痛或酒積食積癥瘕積聚痞癖堅積中滿

膈氣食臭酸醋嘔吐翻胃或膈脹消中善食而瘦或

消渴多飲而數小便或傷風下血痔痛痒痛或瘡疹

偏身癰疽惡瘡或瘡毒已入於裏腹滿嘔吐或成瀉
利或除惡瘡瘰癧肉或下利腹痛或一切風氣肢體疼
痛及中風小兒疳疾諸風癱瘓但平人常服補養榮
衛調和飲食

信砒

乳香

剉在碗
水研細

輕粉

一錢

巴豆

各一兩
都研

龍腦

炒半

麝香

各半兩

青黛

三錢同
研細

黃蠟

三錢

一方用粉霜

先研

一兩 一錢
兩 研細
砒砂

右為細末鎔蠟入蜜半錢就搓勻旋丸菜豆大至小

豆先服小丸病在上食後在下食前在中不計時候
面東頂禮一丸淨器盛水送下合藥即淨處面東每
一丸密念咒三遍或病人不能咒諸人咒或師氏咒
通

咒曰 信香十方金青膏 藥師咒成密遍拋

普濟有緣除百病 仰吞一粒體堅牢

密咒 但言八金剛 莫說十方佛

五蘊六根俱不通 十二上願自然成

如意丸 治虛中積冷氣弱有傷不能傳化心下痞堅
兩脇脹滿心腹疼痛噫宿腐氣及霍亂吐瀉水穀不
化久利赤白膿血相雜久病黃色羸瘦及腹中一切
食癥之疾並皆治之

枳殼

去穢

枳櫛

橘紅

半夏

湯泡七次

蓬朮

京三稜

乾姜

炮

黃連

去脂各二兩

巴豆

七十粒連殼用

右除巴豆外剉如豆大用好醋煮乾去巴豆餘藥焙
為細末薄糊為丸如菜豆大每服十丸加至十五丸

用茶清姜湯送下食後臨卧有孕婦人不宜服

集香丸 治消磨積塊去疾療癖治一切積滯不拘老

弱虛損者皆可服餌

木香

七錢半

萆撥

直者

硼砂

半兩水化開蓋子內培乾

附子

二枚各重五錢

半以上者須得真生好者炮製去皮臍剉出粗末

破故紙

炒各一兩

右五味將飛過硼砂末分在附子窰內却用剉出末子末蓋口用和成白麪裹約半指厚慢火內燒令黃色去麪為末將原裏附子麪丹為細末醋調糊為丸

如菜豆大每服十五丸至二十丸食後生姜湯下

蘓湯煎 治膈中不快酒食不消飲食或忤或不忤善

治脾元一切中虛積滯

肉豆蔻 丁香 木香 礪砂 京三稜 蓬朮

各一兩
燒存性

右為末烏梅肉丸如麻子大每服十四粒空心熟蘓湯送下

聖餅子 治一切沉積氣脹兩脇氣滿無問久新者

大黃

三兩 礪砂

三錢

山梔子

半兩

輕粉

二錢

黑牽牛

頭末一兩

右為細末鍊蜜為丸捻作餅子如小銅錢大每服三餅子細嚼溫酒送下食後臨卧如行粥補之虛實加

減

妙應丹

治諸臟氣虛損積聚煩悶及飲食中蠱毒或

食水陸果蓏蟲卵入腹而成蛇蟲魚鱉或宿食留飲

婦人產後敗血不消女子月水不通結為癥瘕時發

寒熱唇口焦黑肢體瘦削嗜卧多飢食少腹痛大便

糟粕變成冷痢

附子

四箇六七錢重者生去皮臍剉作粗末入礶砂共一兩七錢重麴濟果煨熟去麴不用

草撥

木香

煨

青皮

破故紙

各三兩半

右為末麵糊搜丸如梧桐大每服三十丸生姜橘皮湯下洩利米湯下加至五十丸

麝香丸

治停宿積聚能尋諸處痛凡膀胱氣脇下痛

最難治心腹冷痛溫中快氣此藥主之

麝香

錢一

木香

胡椒

各一兩

全蝎

去毒微炒

巴豆

去皮心各四兩

右為末湯泡蒸餅糊丸麻子大硃砂為衣每三丸常服熱水下心腹痛研煨生姜下血痛炒姜醋湯泡下腎氣脇脹茴香湯下大便秘蜜湯下

枳榔丸 治積食破滯氣

枳榔 木香 人參

各二錢

橘皮

五錢

炙甘草

二錢

右為細末湯浸蒸餅為丸如桐子大溫水下四五十九

五百丸

一名羅漢丸
出李氏方

治宿食留飲積聚中脘噫息吞醋

心腹痛疼并療中虛積聚及臟腑殄泄赤白痢下並治一切酒食所傷化痰涎逐滯氣消痞痛

丁香

巴豆

去皮

縮砂仁

胡椒

烏梅

去核

右各一百箇為細末炊餅糊為丸如菉豆大每服五七丸熱水下食後臨卧服一方姜湯下一方橘皮湯

下

防葵丸

出聖惠方

治積聚氣塊

防葵

五錢

芫花

五錢醋拌炒乾

乾姜

五錢炮

鱉甲

一兩醋炙黃去裙攔

礪

砂 一兩不夾石者細研入

右為細末研入礪砂令勻以米醋一升煎令稠下諸藥末慢火熬入少蒸餅和鎔可丸如菰豆大每服十丸空心溫酒下

土瓜丸

出千金方

治諸臟寒氣積聚煩悶熱飲食中蠱毒或

食生物及生中蟲卵入腹而或為蟲蛇魚鱉留飲宿食婦人產瘕帶下百病陰陽不通利大小便不節絕傷墮落寒熱交結唇焦黑身體消瘦嗜多食少魘產

乳胞中餘疾肢裏小腹中結

土瓜根

桔梗

各半斤

大黃

一斤蒸二斗米下爆乾

杏仁

一升

右為細末蜜丸如桐子大空腹飲服三丸三日不知
加之以知為度

串痺藥

半夏

七枚

白酒藥

一彈丸

杏仁

七枚

右件炒黃色為末用酒蒸化為丸如菉豆大每服五
七丸治嗽卧時白湯下治氣木香湯食後送下

貼臍餅子 治虛中積滯腹脹痞痛大小便不通

穿山甲

炮爆

五靈脂

巴豆

去皮

大蒜

去皮各三錢

右為細末同研如泥作餅子如三錢大用綿裹一餅安臍中著物繫定覺熱藥行宣取效

十三丸

一名守病握疾丹出醫學切問

治諸疾氣心疾

巴豆

去皮用生肉一兩

雄黃

二錢

人言

二錢

粉霜

一錢

先化黃蠟五錢次將四味為細末一時下於蠟內熬勻和冷定為丸如桐子大每服一十三丸先用銀篋

一隻冷水一盞將藥和銀篋浸一宿空心溫水下忌
熱物油膩物孕婦人不可服或自瀉者不可服一方
有輕粉一錢五分

沉香海金沙丸

出衛生家寶

治一切積聚痺濕腫脹肚大青

筋瘦惡症

海金沙

錢一

沉香

錢二

輕粉

錢一

牽牛末

兩一

右為末研獨蒜如泥為丸如梧桐子大每服三十
丸加至十五丸煎燈草湯通草湯空腹送下更量虛

實加減丸數取利為度

利藥盪積

出危氏方

巴豆

百粒去皮水洗四十次

五靈脂

白殭蠶

赤茯苓

各一

兩

右為末醋糊為丸如菉豆大每服七丸冷茶清五更初服或欲瀉止冷水洗手面脚三處立住

太上清金丹

芫花

一兩生

黑豆

一兩生

巴豆

和皮用

五靈脂

一兩五錢

右四味先杵三味末入巴豆同杵醋麪糊丸黍米大

每服三五丸食後各隨病引子下後忌熟食 惡心

痛酸湯下 婦人臍脇刺痛熱醋下 酒病酒下

飲食隨傷物湯下 消積聚溫湯下 白痢生姜湯

下 赤白痢甘草湯下

枳殼散

出十便良方

治心下蓄積痞悶或作痛多噫敗卵氣

枳殼 白朮

各五錢

香附子

一兩 檳榔

三錢

右為細末每服二錢米飲調下日服三服不拘時候

治脇下邪氣積聚往來寒熱如溫瘧

出千
金方

右用蒸鼠壤土熨之冷即易腹中切痛炒鹽半斤令
焦內湯中飲之大吐瘥若手足痛者燒青布內口器
中熏痛處

治萬病積聚湯

出千
金方

七八月收蒺藜子不拘多少以水慢煮熟取滓曝乾
搗篩蜜丸桐子大酒服七丸以知為度其汁煎如飴
服之

尋積丸 治諸般積氣

右用巴豆不拘多少和殼研細黃連生麪等分勻拌
一處冷水丸如桐子大却用麥麩地灰用文武火炒
令乾將冷水一碗安於側候藥丸炒乾可將一丸於
冷水內試以浮在水面為度每五七丸至十丸晚用
溫熱水送應有積皆取下可自看是何積就此藥以
冷水洗了焙乾可服三次又好治痺寒

取積丹

右用好大黃不拘多少為細末用好醎醋熬成膏子
為丸如桐子大每服一百丸加至一百二十九至日
平西喫飯起更前後將細墨研濃好酒送下

治男子婦人諸般積氣成聚

出本草

右黑牽牛子一斤生搗末八兩餘滓子新瓦上炒令
香熟放冷再搗取四兩熟末生末共一十二兩拌勻
令鍊蜜和丸如梧桐子大患疾氣至重者三五十九
煎陳橘皮生姜湯下臨卧空心服如二更至三更以

來藥行時效應未動再與三十丸投之轉下積聚
之物常服十丸至十五丸行氣甚妙小兒十五以下
至七歲以上服五丸至七丸年及五十以上不宜服
之

萬病無憂散 治諸般氣積腫脹

枳櫛

五錢

大黃

一兩

甘草

二錢半

黑牽牛

一兩半炒

右為末每服三錢茶清調服不拘時候日進二服

治久積冷不下食嘔吐不止冷在胃中

出肘后方

右用半夏五兩淨洗過為末每服三錢白麵一兩以水和搜切作碁子水煮麵熟為度用生姜醋調和服之

治結氣冷癥積在脇下及腳氣上入小腹腹中脹滿冷

氣痿痺羸瘦

出千金方

右大蒜去皮心三升擣令極熟以水三升和調絞取汁更擣餘滓令熟以水三升和調絞取汁更擣餘滓以水三升和令調熟取汁合九升所得滓可桃顆大

乘熱却以微火煎取三升下牛乳三升合煎取三升
旦起空腹溫服一頓令盡至申時食三日服一劑三
十日服十劑

萬金丸

出危氏方

治諸般食積氣積血氣蠱脹之類如治蠱

脹加香附子末湯調三錢吞下此藥治腫尤快趙神
服救母已驗方

右石菖蒲去根用剉如米大半斤重斑猫蟲半斤重
去足起同菖蒲火炒不可燒了如菖蒲黃色提起揀

去班猫蟲小布袋盛起菖蒲兩人牽扯布袋去盡班
猫屑止將菖蒲研為細末用米醋煮糊為丸如梧桐
子大每服三十丸隨意加減用溫酒或熟水不拘時
候

治積聚疼痛 每日早晨服香油四兩帶鬚葱白三莖
神效紫金丹

右半夜子時得一夢夢中傳得仙方礪砂輕粉最為
良雄黃甘漆信豆用粉霜七味一錢停分兩三錢黃

蠟粧爛研硃砂做衣裳每服單一粒送用米飲湯不問男子共婆娘多年沉病積取了大安康

香稜丸

出濟生方

治五積破痰癖消癥塊及冷熱積聚

木香

不見火

丁香

各半兩

京三稜

細剉酒浸一宿

枳殼

去穢炒

蓬

莪朮

細剉一兩用去殼已豆三十粒同炒已豆黃色去已豆不用

青皮

去白

川練

子

剉炒

茴香

炒

右等分為細末醋煮麵糊為丸如梧桐子大以硃砂研細為衣每服二十九粒炒生姜湯下溫酒亦可不拘

時候

治傷積有滯食嘔酸調心腹氣膨小腹不仁或時瘧洩

出本
事方

高良姜 陳皮去白 莪術醋炙 烏梅 生薑 甘草

乾姜已上各
等分

右用好紅椒三十粒去子同研為細末每服二錢水
一盞姜三片煎至七分溫服

廣茂潰堅湯

出東垣
蘭室方

治中滿腹脹內有積塊堅硬如石

令人作卧不能大小便澁滯上氣喘促面色痿黃通
身虛腫

厚朴 黃芩 益智仁 草豆蔻 當歸 黃

錢各五

連六錢 半夏七錢 廣茂 紅花 吳茱萸各二錢 生甘草

澤瀉 升麻 神麴 青皮 陳皮各三錢 柴胡三錢

渴者加乾葛根四錢

右咬咀都作一服水二盞浸少時煎至一時去滓溫
服食前忌酒麵二服之後中滿減半祇有積塊未潰

再服半夏厚朴湯

半夏厚朴湯

出東垣
蘭室方

厚朴

分八

半夏

錢一

吳茱萸

錢一

肉桂

錢三

桃仁

七箇

紅花

蘓木

京三稜

分四

蒼朮

草豆蔻

白茯苓

各三分

澤瀉

分三

猪苓

分四

乾生姜

分一

柴胡

分三

升麻

分四

木香

分二

青皮

分二

橘皮

分三

生黃芩

分三

黃連

分一

生甘草

分三

昆布

少許炒麴

六分當歸

尾四分

如渴者加葛根

分三

右拌劉如麻豆大旋稱都作一服水先拌藥次用水

三盞煎至一盞去滓稍熱服之忌如前服此藥二服
之後前症三減半即於前藥中加減服之

厚朴

半錢

黃芩

二分

黃連

一分

炙甘草

五分

吳茱萸

一分

益智

二分

縮砂仁

一分

草豆蔻仁

三分

半夏

四錢

廣茂

三分

當歸梢

一分

紅花

少許

右剉如麻豆大煎法如常忌苦藥泄便又忌鷄魚兔
肉并鹽物房事

軟金丸 取一切虛中積滯兩脇有塊寒熱往來治危

疾皆驗諸藥既為蠟櫃已無狼虎之性專攻病而已

粉霜 輕粉 礪砂 蜜陀僧 砒霜 雄黃

各一錢

烏魚骨

白丁香

即雀糞也

黃鷹條

即鷹糞也

巴豆仁

二兩

去膜
研細

右件藥一處研為細末黃蠟一兩鎔和為膏旋丸如

小豆大每二丸食後臨卧冷水浸一時辰即用水下

醫者夏巡所傳每用以為神藥

木香三稜丸

出聖惠方

治積聚氣塊

木香

半兩

京三稜

一兩

莞花

一兩

乾漆

半兩

川大黃

一兩

青橘

皮

半兩湯洗
去白穢焙

右件藥搗碎以醋二斤慢火煎令醋盡焙乾為末以醋煮麴糊和為丸如菉豆大每服空心生姜湯下十五丸加至二十丸

六神丹 治男子婦人遠年近日飲酒過度結成痞塊

噫醋吞酸肚腹膨脹疼痛諸般積病

巴豆

去皮油膜

蓬朮

青皮

陳皮

白姜

炮

黃連

各一

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服十丸至十五
丸姜鹽湯送下或米飲茶湯亦可面色痿黃已患傷
寒不痊者用藥二錢茶二錢生姜三片葱白一根水
一盞半煎至一盞吞下六神丹用被蓋出汗宣三五
行溫粥補痺寒亦治婦人血氣病兩脇痛用紅花酒
下十丸 男子冷氣或兩肋刺痛炒茴香酒下十丸
冷瀉酸醋湯下十丸 熱瀉冷水送下十丸 痼聚

積滯隨意斟酌加減服之

五積丸

大黃

三錢

黃栢

三錢

檳榔

七箇

山豆

一兩半

蛤粉

三錢

雷丸

三錢

右為細末醋麵糊為丸如桐子大每服二十九丸溫水

送下

起痛散

仁存方

治神氣不守正位為七情忤氣聚涎結結

積堅牢有塊心腹絞痛時發時止發則欲死

蓬朮

桂心

各一兩

檳榔

半兩

附子

炮

細辛

各半兩

芫花

炒為末
二錢半

右除芫花外一處為末每服三錢水一盞煎至七分

去滓調芫花末一字匕溫服

青木香丸

出德生堂方

寬中利膈行滯氣消飲食治胃膈噎

塞腹脹心下堅痞腸中水聲嘔噦痰逆不思飲食

補骨脂

炒香

萆澄茄

檳榔

酸棗米飯裏濕紙包火中煨令紙焦去飯各四

十兩黑牽牛

二百四十粒炒香別搗末一百二十粒

木香

二十兩

右為細末入牽牛末令勻漸入清水和丸如菉豆大
每服二十丸茶湯熱水任下酒食後可服五丸或七
丸小兒一歲服一丸懷妊婦人忌服

水煮桃花丸

出傷門
事親書

黑牽牛頭末

半兩

苧蒂末

二兩

雄黃

一錢水飛
通用之

乾胭脂

右以雄黃水調麵為丸以水煮令浮熟取出冷水拔
過麝香湯下

硫黃丸

出聖
惠方

治積聚氣多年不消變成癆症腹內結塊

疼痛脹滿常吐清水食飲不下

硫黃

半兩
細研

硼砂

半兩不夾
石者細研

木香

半兩
為末

巴豆

去皮四
十九粒

取蘿蔔一枚四破開錯四十九竅各納巴豆一枚
依舊合之藏在土坑中深一尺四十九日後取去

巴豆研如膏壓去
油再入器中研

右件藥取蘿蔔一枚剝作坑子內硫黃硼砂却以蘿

蔔蓋頭用紙重裹以好黃泥固封曝用大火煨令通

赤候冷去泥取出藥研蘿蔔一時細研入前木香末

及研了巴豆令勻以醋煮麵糊為丸如菉豆大每服

空心溫酒下五丸晚食前再服以利為度

知命丹

出醫學切問

治虛損撮痛下痢

烏頭

去皮臍三錢半

黃丹

五錢炒

巴豆

三枚去皮膜不用油

右同研麵糊為丸如麻子大米飲下三丸立效如瀉

下丸子來不化即病不療

磨積丸

出衛生家寶一名脾疾丸

治茶傷飲食減少面黃腹痛及百

物所傷常服消滯氣

陳倉米

半升用巴豆七粒去殼同米炒令赤色去巴豆不用

青皮

去穰炒

陳橘

紅各二兩

右為末好醋糊為丸如豌豆大每服二十九丸食後用

淡姜湯下

神明度命丹

出千金方

治久患腹內積聚大小便不通氣上

搶心腹中脹滿逆害飲食

大黃芍藥

各二兩

右為末如梧桐子大溫水服四九日三不知可加至

六七丸以知為度

炒粉丸

出仁存方

治積聚涎塊結於心腹之間致令心腹刺

疼日久不愈或乾嘔減食

蚌粉

一兩

巴豆

七粒去殼及膜

右同炒令赤色去巴豆不用只以醋丸蚌粉如梧桐

子大丈夫臍腹痛炒茴香酒吞下二十九婦人血氣

炒姜湯下敗血衝心童便和當歸酒服常服姜酒下

治酒食積水病

石榴雙用又連枝

三稜巴豆五靈脂

瞿麥杏仁車前子 大戟芫花甘遂宜

右醋糊丸七丸為止

五香蠲痛丸

出百一選方

治冷物傷脾胃并酒食傷久積成

癖胃膈痞塞心腹疼痛不可忍者服之立效有傷滯
臟腑不過一行無傷滯臟腑不動

丁香 藿香 木香 乳香 沉香 桂心 吳

茺萸 青皮 蓬莪朮 枳殼

去白麴炒

京三稜

各一兩

礪砂

四錢

一用牽牛末

三兩

橘皮

一兩

去白同巴豆五錢去皮炒令黃色去

巴豆
不用

右為細末麵糊為丸如菉豆大每服二十九至三十丸熟水送下一方用枳實不用枳殼

大蒜煎

出千金方

治疰癖積聚冷癖痰飲心腹脹滿上氣咳

嗽及風癰偏風半身不遂腰疼膝冷氣息痞塞百病

蒜

六斤四兩去皮切水斗煮取水去滓

酥一斤八

蒜汁用

牛乳

三斤

華撥

胡

椒 乾姜

各三兩

阿魏

戎鹽

各二兩

石

石菖蒲

木香

各一兩

乾蒲桃

四兩

右為末合入蒜汁中以銅器微火煎取一斗空心服
酒下一兩五日以後稍加至三兩二十日覺四體安
和更加至六兩此治一切冷氣甚良

丁香丸

出楊氏
博濟方

治停滯不消胃膈痞滿心腹疼痛嘔逆

常服磨積破塊消酒食毒

丁香 木香

五靈脂

去沙

京三稜

煨

蓬莪茂

炮

茴

香

以上六味
各半兩

乾漆

三錢炒
烟出

胡椒

四錢

栝榔

二枚

青橘皮

白陳橘皮

去白各
一兩

巴豆

春夏四十粒秋冬一百粒
去殼將二橘皮同巴豆炒

今已豆黑色

不用已豆

右件為細末用礪砂二錢酒浸去沙石入醋一盞麵一兩煮糊為丸如桐子大朱砂麝香為衣每服二丸至九丸生姜湯下或溫酒送下

解毒栴榔丸 治心火有餘腎水不足洪範曰火曰炎上水曰潤下當心火有餘腎水不足乃陽實陰虛此藥抑上奉下心火自降腎水昇上實下虛之人常患也此藥壯陽筋骨添髓起陽道益子精益壽內經曰

諸濕淫滿皆屬脾土此藥流濕潤燥推陳致新滋陰
陽散鬱結活氣通血能治男婦嘔吐酸水痰涎不利
大便秘血閉澀風壅精熱口苦煩燥涕唾稠咳嗽血
弱血崩腹脹氣滿手足痿弱四肢無力面色痿黃又
治酒疸食黃宿食不消口苦生瘡骨蒸肺痿寒熱往
來瘧疾腸風痔漏發痛消痺癰疽血積成塊硬積諸
惡瘡疔瘡背疔疽瘡急宜多服速利三五行為妙四
方人不服水土傷寒結胃以利為度婦人赤白帶下

血崩漏不止血胎艱難調血脉每服五十丸溫水隨
意服之

栝榔

黃連

青皮

陳皮

去白

木香

沉香

巴

戟

酒浸
去心

當歸

廣茂

火炮

枳殼

炮去
穰

香附子

炒

甘草

去皮
炙

大黃

以上各
一兩

黃柏

三兩

牽牛頭

末四
兩

右為細末滴水為丸如桐子大每服三十丸或四十
丸五十丸生薑湯下溫酒亦可服食後食前量病上
下

十寶大安散

一名萬病無憂散

治男子婦人老幼年深日久一

切沉疾積氣塊十種水氣血氣下部小腸偏墜木腎
乾濕脚氣十隔五噎番胃嘔吐食心氣脾疼喘急痰飲
咳嗽肺脹吐血鼻衄五淋白癩大風瘡癰腰腿疼痛
五種消渴二十四種痔漏腸風下血三十六種風七
十二般氣丹毒赤腫紫血癰風癰疽瘡毒左右癱赤
白瀉痢寒熱瘧疾陰陽二毒山嵐瘴氣婦人赤帶下
經脉不調崩中漏下小兒疳氣癰瘤亦皆治之須依

四季加減修合

大黃

春冬一斤夏半
斤秋十二兩

甘草

春冬六兩夏
三兩秋四兩

牽牛

春冬
十二

兩生夏八兩
半生秋八兩

檳榔

春冬十二兩夏
八兩秋六兩

右藥每一斤用木香半兩夏加南木香秋加天花粉

為細末每服三錢重五更雞初鳴時用冷水調下加

黃芪蜜炙七次陳皮去白胡椒生蓬莖炮三稜炮自

然有瀉有補其藥須在五更初用冷水調下則病根

隨大便取下或赤黃白青黑如爛魚腸或小便中取

下或黃或白如米泔或是寸白疳癰蟲血癆蟲形如蜈蚣如蠶如蠅螂又如肉塊如馬尾如亂絲如猴猴如小蛇狀不拘四季服此藥又無諸毒惡百無所忌但娠婦不可服必五更初服者蓋人一日受用飲食諸物至子時宿食皆消此時服藥故速見效或瀉二三次或五七次更不必補藥一兩服其瀉自住十五歲以下只作一服十五歲以上作二服小兒隨意加減

又方

牽牛

木香

赤土

生

貫仲

鵲虱

各一兩

大黃

紙裹

煨

大腹子

檳榔

生

雷丸

生各三兩

甘草

二兩

右為末每服二錢五更用冷水調下清茶亦可服治

百病

保安丸

出楊氏博濟方

治男子婦人一切酒食所傷取積滯行

冷氣

巴豆

半斤去皮心研紙裏去了油入藥同研

黃連

一兩去毛炒紫色

青橘

去白

一兩炒
轉色
蓬莪茂
炒紫色
乾姜
一兩炮烈去皮
切再炒少時

右四味為細末入前巴豆同研令勻以米醋糊為丸
如麻子大用硃砂衣常服白湯下二丸大人三丸霍
亂吐瀉用煨生姜湯下五丸小兒三丸心氣痛醋湯
下三丸白痢乾姜湯下赤痢甘草湯下五丸小兒一
丸至二丸服如踈轉即多服之

丁香煑散
出入
宜方
治脾胃伏冷吞酸嘔逆積飲聚痰

丁香
乾姜
紅豆
青皮
陳皮
甘草
川

烏 良姜

各四兩

胡椒

二兩

益智仁

一兩

右咬咀薑鹽水煎

小七香丸

治茶酒食積吐酒酸心

丁香 香附子

甘草

各十兩

莪朮

砂仁

各二兩

甘

松

八兩

益智仁

六兩

右為末糊為丸菜豆大每服三十丸溫酒姜湯下內
加烏藥藿香陳皮麥芽肉桂名大七香丸以蜜丸如
彈子大姜湯嚼下如酒積酒下茶積茶下食積丁香

良姜湯下

三稜丸 治積年五臟氣塊積滯

京三稜

石三稜

二味醋浸一宿切片醋熬成膏

鷄爪三稜

炮青

橘白厚朴

去皮姜汁塗炙

礞砂

飛過熱成膏

巴豆

出油去皮上各半兩

枳

榔

二箇生用一箇炮一箇

肉豆蔻

一箇去殼

木香

一錢乾漆一錢炒

右件十一味為末入于膏子內和勻杵一千下丸如

菴豆大每服五丸如呃氣茴香湯下臍下氣塊神麴

湯下心膈氣良姜下左脇塊柴胡湯下右脇塊木香

湯下血氣當歸湯下血氣痛赤芍湯下

萬病丸

出醫學切問方

破一切積散一切氣蠱血氣結塊冷痛

癥瘕積聚心氣脾疼食積酒積肉積胃冷吐食氣膈
噎塞不通遍身浮腫氣急疲癯婦人血氣不行腹肚
疼痛年深日久並皆治之

硼砂

阿魏

醋研去土

大黃

吳茱萸

去皮

青礞石

研細末用

縮砂拌和鍋內炒取淨

肉桂

木香

玄胡蘺

五靈脂

酒淘

淨

小茴香

炒

川山甲

蛤粉炒

乳香

沒藥

當歸

石菖蒲

皂角

去皮

乾漆

炒烟

栝榔

陳皮

去白枳

殼

京三稜

煨

丁香

莪朮

煨

良姜

炒

甘遂

元

花

醋炒

大戟

雄黃

各半

巴豆

去皮

油膜

右為細末醋煮麴糊為丸每三十丸空心生姜湯下
利行白粥補之更量虛實加減丸數

八仙丹

出醫學切問

治一切積氣

京三稜

煨

五靈脂

酒浸淘去土

杏仁

去皮尖另研

巴豆

去油膜

右各等分為末用豆淋為丸如桐子大每服七丸空

心溫水下看病大小加減丸數活人書名黑神丸治

傷寒食積

三稜丸

出醫學切問方

治五積六聚七癥八瘕破一切血下一

切氣

大黃

煨

礪砂

三稜

煨熟切

乾漆

炒烟盡

巴豆

去皮油各一兩

右為末醋煮糊為丸如菜豆大每服三丸或五丸七

丸量人虛實加減服空心米湯下

三倍丸

出醫學切問方

取積

巴豆

一兩

蛤粉

二兩

黃柏

三兩

右為細末滴水為丸每服五丸如桐子大井水下

剪紅丸

出醫學切問方

追蟲取積追五臟不損六腑遠年近日

諸般蟲積食不消婦人赤白帶下痢疾並皆治之

枳榔

六錢

白牽牛

十二兩取頭末

蕪荑

六兩

雷丸

五兩

巴豆

一兩取霜

土硃砂

右為細末滴水為丸硃砂為衣如桐子大每服一丸

蜜水送下取下病疾為驗白粥補之

如聖丸

出醫學切問方

治男子婦人飲食所傷結成積塊痞痛

陳皮

乾姜

各三錢

巴豆

一錢

甘草

一錢

三稜

莪朮

芫花

三味各半兩加醋一升煮耗大半取焙乾

右為末和勻餘醋煮糊為丸菜豆大每服六七丸淡

姜湯下

薑合丸

出楊氏博濟方

治中脘積聚痰氣胃膈結痞欲成翻胃

木香

附子

炮

肉桂

礞砂

紙上飛過

丁香

沉香

華澄茄

製青皮

淨陳皮

各半兩

茴香

二錢半炒

右為細末入礪砂和勻酒煮麵糊為丸每兩作勻二
十九每一丸生薑一塊剉入合子安藥在內濕紙裏
煨令香去紙放溫細嚼鹽湯下

枳殼丸

出海岱居士方

磨積散聚劑料治積聚身黃無力神暈

困倦則發潮熱嗜卧

枳殼

三兩去穢麤炒

當歸

一兩半夏

廣茂

京三稜

各二兩炮

益智仁

二兩

玄胡

二兩

縮砂仁

四兩

青皮

二兩

黑牽牛

頭末十兩

木香

一兩

雷丸

二兩

右為細末生薑汁打糊為丸每服四五十丸生薑湯

食後送下

牛黃利膈丸

出海岱居士方

治新久積聚胃脘脹滿等症

大黃

黑牽牛

頭末各四兩

甘遂

半兩芒硝三兩

右為細末滴水為丸如桐子大每服八十丸溫水食

前送下量虛實加減或五六十丸亦可

寸金塌氣丸

出鮑氏方

治一切積聚一切氣癥小腸風氣膀胱

氣橫梁氣走注氣心脾氣血氣脇氣氣塊癥瘕瘰癧

毒宿食積飲結胃中傷寒夾食傷寒風漏氣通經產
孕不可服氣虛人量與

陳皮一兩 香附子一兩 大黃煨 木香 青蒙石煨各半兩 斑

蜚蠊用身 白丁香尾起者半兩 青娘子用身一錢 蚤蟲用身二錢 京

墨燒烟盡三錢 麝香一錢 三稜半兩 蓬朮半兩 巴豆和殼捶碎一兩炒

乾漆炒烟盡半兩 乾姜一兩 栝榔五箇 芫花醋浸焙乾三錢 水蛭炒治

氣塊他
不用

右末醋糊為丸皂角子大每服一丸瀉三行自止醋

湯嚼下 臟虛人勿服

二香丸

出直指方

治積滯氣秘心腹刺疼中滿壅嗽

南木香

丁香

青皮

浸去白晒

橘紅

草菓仁

肉

豆蔻

生

白豆蔻

仁

五靈脂

香潤者另研各半兩

蓬朮

炮煉熟碎碾

縮砂仁

各七錢

右細末用川巴豆肉半兩研如泥漸入藥末研和稀

白麵糊丸麻子大候乾每服三丸加至五丸七丸止

姜湯送下壅嗽紫蘓生姜煎湯下

三稜散

出直指方

治酒食傷積

京三稜

炮

蓬莪朮

炮

益智仁

甘草

炙

青皮

去白各二

兩

白茯苓

兩四

右末每服二錢少鹽煎吞感應丸治傷寒泄瀉俟酸臭出盡即服固腸散止之

回生丹

治一切積聚

乳香

光明礪砂

釜煤

沒藥

與乳香同作細塊火上燒放于

通風處吹

水銀

礪石

輕粉

以上各一錢

巴豆

十四粒去殼并心膜

出油
五分

右同研不見水銀蒸棗肉丸如桐子大硃砂為衣晒乾入乾姜末內收臨時用針鑽一眼別以生姜三片葱白二寸皂角一寸不槌破三味同煎湯放冷入醋少許吞下一粒五更初不效以熱粥投之此藥取臍腹上下左右脇下心下久積三五年氣塊食塊血塊大如盞碗或如數箇毬子取下惡物為效別以和氣藥補之

礞石散 治一切積不問虛實冷熱酒食遠年日久無所不療

青礞石

二兩研

滑石

一兩研

青黛

五錢

輕粉

二錢

右同礞勻每服一錢麵湯調下急以水漱口未服藥前一日先喫淡粥至晚服藥候次日晚未動再服半錢取下惡物更以湯粥將息三兩日如是無積藥隨大便下並無所損忌次日將息

蠟丸 治一切年深日近積毒

巴豆

一百二十粒去
皮并心膜研細

膩粉

一兩

金箔

十片
研

硃砂

二錢
研

黃蠟

半兩

右鎔黃蠟丸如桐子大房色傷風腎臟風遠年日近
積滯氣塊癆病水氣同用膩粉半錢先置喉中次以
藥三丸用溫米飲吞下急以水漱口恐膩粉損齒如
傷毒藥用生姜酒下一丸病淺者一宿二三十年者
三五日方取下如取下復收其藥洗而再服尤佳如
體弱服之即進飲食倍常

如意丸 治積化氣

黃連 青皮 川烏 枳殼 巴豆

十粒去殼
油心膜盡

乾

姜 蓬莪茂 陳皮

各一兩

右為細末煮薄糊為丸如菉豆大常服三五丸茶清下食後夜卧服孕婦不可服 婦人血氣艾醋湯下

黃腫淡姜湯下 臟腑不快茶清送下 冷食傷

生姜湯下 小腸氣炒茴香酒下 小兒疳飯湯下

一兩丸 酒積炒姜酒下

三稜湯

和脾胃消積滯快膈化痰進食亦治心腹暴

疼

京三稜

四兩

蓬莪茂

四兩二味先洗過水五升

煮半日取出切片子焙乾

益智

仁

二兩

青皮

半兩湯浸去穢焙乾秤

甘草

二兩炙

陳皮

湯浸去白穢焙乾秤

半兩

右為末每服三錢入鹽點服或用水一盞姜三片棗

一枚煎至七分服

乾柿丸 取虛實積下膈甚妙

乾姜

炮為末

硃砂

研為末

沒藥

研

猪牙皂角

去皮弦子為細末

三稜

炮為末

乾漆

槌碎炒烟盡為末以上各一錢七

水銀

一錢結沙

輕

粉

二錢 青礞石

為末一錢

巴豆

二十粒去皮膜炙沸研

右件研各勻軟飯和為丸如菉豆大煎柿蒂湯冷下
三五丸加減用婦人有胎不可服

磨三稜丸

治遠年近日諸般積聚瘕癖積聚或氣塊

酒積諸般所傷無問男女老幼並宜服之常服飲食

木香

半兩

京三稜

炮

石三稜

鷄爪三稜

各等分

硃砂

黑牽牛半兩 白牽牛半兩二味半 乾漆三錢炒 香

附子炒三錢 麥蘖半兩 陳皮三錢 青皮二錢 廣茂半兩

杏仁半兩 枳殼半兩 葛根三錢 檳榔二錢 丁香二錢 官桂

半
二錢

右為細末好醋麵糊為丸如桐子大每服二十九生
姜湯送下食後日二服病大者四十日消溫水服藥
亦得

聖散子 治遠年積塊及治婦人乾血氣

礪砂

八兩

川大黃

八兩

麥蘖

六兩

乾漆

三兩

炒以烟盡為度

蒺藜

一兩

瞿麥

一兩

栝榔

一兩

茴香

一兩

炒

右為細末每服五錢溫酒調下仰卧此藥只在心頭至明大便如爛魚腸小便赤為驗藥無毒有神效小兒用一錢十五以上五錢或七錢空心服之更效

醋煮三稜丸

治一切積聚不論遠年近日皆治之如

神

京三稜

四兩醋煮令竹篦子刺透軟切作片子曬乾

川芎

二兩醋煮微乾切作片子

大黃

半兩醋濕紙裹火煨過

右三味同為末水煮和為丸如桐子大每服三十丸
溫水送下不拘時候病甚者一月效輕者半月效

化滯丸

出家藏經驗方

治脾肺氣滯水飲停積膈痺口滿咳嗽

涎壅嘔吐頭昏飲食不下或痰痞氣膈陰陽不通併
厥口噤昏默不省人事狀似中風使以此藥服之則
蘓或吞藥不得者即碎和湯灌之下咽即醒此藥應是
因患怒氣逆飲食湯水停聚胃膈成病以致十膈五

噎翻胃嘔吐飲食不下者服之無不效驗常服寬中
化痰快美飲食消化停滯不犯胃氣神效

京三稜

蓬莪朮

桔梗

大黃

陳橘皮

以上各一

兩用溫
湯洗過

半夏

一箇破
作二片

白朮

一兩與前件並
剉如皂角子大

旋覆花

一兩
鰾甲

去裙二兩
作四片

葶藶子

一兩半淘淨
生絹袋盛之

紫蘓葉

一兩

木香

三兩
懷乾

沉香

半兩剉
細生用

麥蘖

一兩
微炒

枳榔

半兩
生用

舶上

茴香

半兩水淘
去土乾秤

硼砂

一兩半細研剉用瓷器內入
前藥內用米醋三升浸重湯

煮取二

斤半

右用煮藥作一處焙羅和入生藥除木香沉香麥蘗
茴香檳榔不入醋煮右用煮藥作一處焙羅搗為細
末用煮藥醋調麵糊煮搜和入石臼中多杵丸如梧
桐子大每服二十丸溫熱水下婦人血氣心痛炒姜
醋湯下湖廣總餉林元禮云此方乃其鄉里名醫常
用取效秘而不傳後董參預體仁與咸年而亦得林亦
珍重慨然傳真有奇效

天南星丸

出家藏
經驗方

去酒積酒毒

天南星一斤端正者淨洗先於平實地上掘窟闊五寸深一寸取土用剛炭於窟中簇煨過半除火去灰令淨以煮酒一升澆之將天南星於其中覆以瓦盆用所掘土泥封盆縫勿令透氣一宿來早取出用酒并水各二升和洗淨切作片子焙乾研為細末入水飛辰砂一兩姜糊為丸桐子大以水飛辰砂一兩為衣每服五十丸至百丸生姜湯下不拘時候先公記前輩云宣和間一朝士作殿試官時蔡攸為大試官

入赴內宴成夜時出歸幕次衆官迎揖蔡指喉以示
謂酒至此就坐索天南星丸執事者供一藥噉其色
紅姜湯送下假寐少頃即醒然遂趨朝班衆官但神
其藥而不敢請其方紹興間先公守贛倅車鄭顯中
其子困酒致疾統軍中輔達云正好服天南星丸遂
叩之口傳其法得之呂丞相余在侍側親聞之亦曾
修合而服果有奇效

厚朴丸

出朱氏
集驗方

寬中進食推化積聚

厚朴

四兩去浮皮用生薑自然汁炙焦黃

蒼朮

一兩米泔水浸洗曬乾切片畧炒

莪

朮

二兩濕紙裹煨去皮切片

青皮

二兩洗去穢曬乾剉細畧炒

陳皮

二兩去穢洗曬

乾剉細畧炒

當歸

一兩去蘆洗淨曬乾

京三稜

二兩去蘆切片

白芷

二兩切片

以上老醋浸七日春夏浸五日
取出焙乾研為細末入后藥中
禹餘糧火煨醋碎
末用水飛過再入乾鍋內
針砂二兩淨洗用醋浸
火煨通紅淨秤二兩再碎
一宿煑乾研極淨
秤

右二味同前藥末入醋煑麵糊搜和為丸如桐子大
候乾每七八十丸至百丸陳米飲送下食前

金草丹

出王氏
博濟方

消磨積聚下酒食毒及取虛中積滯

舶上硫黃

一分
研細

顆塊硃砂

一分
研細

末香

末一錢半

水銀

膩粉

二錢

川大黃

三錢畧慢火中煨
熟搗碎秤用之

巴豆

十粒或十
二粒去皮

出心細
研如粉

右同乳鉢內研二三百遍如粉細入酒浸蒸餅為丸

如萊豆大療諸病以生姜湯橘皮湯下三五丸酒食

傷飽二三丸湯茶下

黑丸子

出朱氏
集驗方

治長幼積滯

烏梅

二箇去核焙乾

生半夏

大者五箇

杏仁

五粒去皮尖麤炒

巴豆

十二

粒去油

存性

右為細末姜汁煮糊為丸菜豆大姜汁下二十九

遇仙丹

出朱氏集驗方

去一切積滯

陳皮

去白

良姜

吳茱萸

洗

石菖蒲

半夏

湯泡七次

白

姜

五靈脂

胡椒

各半兩

斑蝥

二十一箇去翅足同糯米同色巴豆

炒巴豆

二十一箇去殼同斑蝥炒

右為細末醋為丸如菜豆大熱水下或姜湯下每服

十丸

馬家五積丸

出朱氏
集驗方

治諸積聚

硝砂仁

巴豆

黑牽牛

蘿蔔子

赤小豆

丁香

以上各一兩同炒
令香透不可焦

青皮

陳皮

香附子

乾漆

京三稜

大戟

桔梗

枳殼

以上各一
兩剉大塊

慢火炒令
黑紫色

右件共為細末如礮時餘得藥頭再炒令黑色再礮
為末以好醋麵糊為丸如菜豆大無時候淡姜湯下

三稜丸

出朱氏
集驗方

化積氣去來五穀麵食等積

陳倉米

一兩巴豆新者五粒去殼同倉米
慢火炒巴豆焦色去巴豆不用

陳皮

半夏曲

半兩

縮砂仁

麥蘖

各二錢

南木香

一錢

右用神曲糊為丸菜豆大每服二十九食後姜湯下

食藥三稜丸

出朱氏
集驗方

化飲食積聚

陳倉米

四兩揀淨以新好色巴豆二十一粒剥去
殼慢火同炒候米香熟黃色巴豆黑色去

巴橘紅

四兩
去白

烏梅肉

半兩
炒乾

縮砂仁

一兩

神曲

三兩作
末煮糊

右四味為末用神曲糊為丸如菜豆大每服二十九

姜湯下

破滯氣湯

出東垣
蘭室方

白豆蔻仁

橘皮

桔梗

大腹子

白茯苓

各半

錢

縮砂仁

各二錢

人參

各一錢

青皮

枳榔

木香

姜黃

各二錢

白朮

炙甘草

各四分

白檀

二分

藿香葉

三分

右為細末水一大盞煎至三分去滓稍熱服之

治膈中有結聚覺咳不出者

右以藜蘆一兩炙末之巴豆半兩去皮熬之先搗巴

豆如泥入藜蘆末又擣萬杵木蜜和為丸每服一丸
至二三丸如麻子大服之

削堅丸

出楊氏家藏方

治五積六聚氣結成塊食積癖瘕心腹

脹滿瘦瘁少食

鱉甲

醋浸二宿去裙開炒焦醋淬黃色取末

京三棱

剉如半棗大炒醋浸二宿焙乾

取末

乾漆

搗碎炒令烟出搗細取末秤三味各二兩半

沉香

半兩乳香二錢

半別

栝榔

木香

乾姜

炮

沒藥

別研

肉桂

去粗皮

細

松烟墨

燒去膠

胡椒

蘿蔔子

乾蝎

微炒去毒

硼砂

明

者為末用湯內飛
以上十味各半兩

粉霜

二錢
別研輕粉二錢
五分

右件為細末拌勻好醋煮薄糊為丸如小菴豆大每
服二十丸淡醋煎生姜湯下日進二服夜一服如未
利漸加微利即減

小沉香丸

出楊氏
家藏方

治五積氣滯腹滿脹痛吐逆噎塞胃

膈痞悶吞醋嘔噦面黃瘦羸胃氣弱不能尅化水穀
痰飲癖塊發歇疼痛不思飲食

青橘皮

去白

陳橘皮

硝砂仁

木香

京三稜

炮

蓬莪茂

地以上五
味各半兩

丁香皮

六錢
烏梅

去核焙
乾二兩

巴豆

二十

枚不去
皮炮

硼砂

別研

肉桂

去粗皮二
味各一分

右件為細末麪糊為丸如菜豆大每服十五丸姜湯

下食後服

萬金丸

出王氏
傳濟方

治積滯順三焦利胃膈定氣刺攻痊脇

腹脹痛女人血氣小兒夜啼多涎并宜服

舶上硫黃

一分
巴豆

去皮秤半兩二味同以生絹袋
子盛於水內用文武火煮一沸

時放冷別
研令細

柴胡

半兩

附子

一分

姜乾

半兩

桔梗

一分
青

黛半兩當歸一分陳皮去白

右為末以麪糊為丸如小豆大每服二丸至三丸溫水下血氣醋湯下小兒夜啼溫水下一丸水瀉生熟水下白痢地榆湯下赤痢乾姜湯下化涎生薑湯下一切氣生薑橘皮湯下

阿魏丸

出濟生方

治積氣肉積心腹膨脹結塊疼痛或引脇

肋疼痛連背脊不思飲食

木香

不見火

檳榔

各半兩

胡椒

阿魏

用醋化開旋入各二錢半

右為末用阿魏膏子并粟米飲杵和為丸如桐子大
每服四十丸不拘時候用生姜橘皮湯下

曾異庵剪紅丸

出水類
鈴方

史君子

一兩

雷丸

一兩半

栝榔

各半兩

黑牽牛

八錢

木香

半兩

青皮

一兩半

天花粉

五錢

草烏

二兩半

香附子

三稜

炮各

一兩

右為末皂角熬膏為丸菜豆大每服三十丸空心冷

茶下

又方

雷丸

兩一

栝榔

兩四

大腹子

斤半

黑牽牛

斤一

莪朮

三稜

各一兩

皂角

斤三

乾韭根

兩一

用井花水三升搥碎皂角將汁絹濾過瓦器熬膏入前藥末為丸湯使隨所病宜藥煎湯下

導引法

養生方云以左足踐右足上除心下積又云病心下積聚端坐正腰向日仰頭徐以口內氣因而咽之三

十通而止開目又云左脇正卧伸臂直脚以口內氣
鼻吐之週而復始除心下積聚大便又云以左手按
右脇舉右手極擎除積下老血又云開口微息正坐
向王氣張鼻取氣臭置臍下小口微出十二通氣以
除積聚低頭不息十二通以消食飲令人輕強行之
冬月令人不寒又云端坐正腰直上展兩脇仰兩手
掌以鼻內氣閉之自急七息名曰蜀王橋除脇下積
聚又云向辰去枕正偃卧伸臂腹瞑目閉口不息極

張腹兩足再息頃間吸腹仰兩足偃拳欲自微定復
為春三夏五秋七冬九蕩滌五臟津潤六腑所病皆
愈腹有病積聚者張吸其腹熱乃止癥癖散破即愈
矣

普濟方卷一百六十九

欽定四庫全書

普濟方卷一百七十

明 周王朱橚 撰

積聚門

肥氣 附論

凡積氣在左脇下如覆杯有頭足名曰肥氣肝之積也
肝臟血故陰多而陽少病為氣積此由肺病傳肝肝傳
脾以季夏適王而不受邪氣留於肝故結為積久不愈
令人發欬逆痰瘧連歲不已以仲夏戊巳日得之以陰

盛陽虛故也

方

酸棗仁丸

出聖濟
總錄

治肝積肥氣久不已變瘡令人熱多

寒少小便赤澀

酸棗仁

生用

薏苡仁

紫蘇子

炒研

木通

黃芪

剉

枳

殼

去穢
炒

升麻

大黃

剉炒

坐挈草

麥門冬

去心
焙

木

香

赤茯苓

去黑皮
各一兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九漸加至三

十九煎麥門冬湯下

蓬蘽根湯

出聖惠方

治久積結癖氣不散左脇下如覆杯咽

酸吐水面目黃痿此名肥氣並女子血瘕

蓬蘽根

剉二兩

牡丹皮

剉

赤芍藥

各一兩

桂皮

去粗

栝榔

剉

枳殼

去瓢麤炒各三分

當歸

切焙

生薑

去皮切焙半兩

生地黃

焙用

一兩半

右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服空

心日晚各一服

防葵散

出聖惠方

治肥氣在右脇下結聚成塊腹膜脹不欲

飲食

防葵

訶梨勒皮

白朮

各三分

郁李仁

三分湯浸去皮微炒

吳茱萸

半兩湯浸七遍焙乾微炒

桂心

三分枳實

半兩麩炒微黃

木香

三分

栝榔

三分

右為散每服三錢水一中盞生姜半分煎六分去粗

食前稍熱服

三棱丸

出聖惠方

治肥氣在左脇下如覆杯有頭足令人羸

瘦發寒熱不能食

荆三稜

川烏頭

一兩炮烈
去皮臍

雄黃

半兩
細研

礪砂

一兩
不炙

石者
細研

青橘皮

半兩湯浸
乾去白

乾漆

半兩搗碎
炒令烟出

鱉甲

一兩
塗醋

炙令黃色
去裙攔

防葵

一兩
麝香一分
研

右為末研前藥令勻以米醋一升熬令稠少入麵作糊和丸如菉豆大每服十九空心溫酒送下

青蒿湯

治久積肥氣寒熱痰瘧

青蒿

自然汁
一合

汁生薑

自然汁
半合

童便

半合

常山

剉三分

鱉甲

去祐攔
醋炙黃

烏梅肉

焙各
半兩

甘草

炙劉
一分

柴胡

去苗
三分

右除汁外粗搗篩每五錢水一盞半煎至八分入煎
三味汁合少許同煎至一大盞去滓臨卧溫服

麝香丸

左脇下如覆杯有頭足不已令人發痰瘡熱

瘡間日作始由肺病傳肝肝多傳脾脾乘王而不受
邪其氣流於肝故結而為積謂之肥氣其脈澁結或
弦而細

蓬莪朮

炮一
兩

桂心

當歸

人參

各半
兩

細辛

烏

頭

炮去皮
各一分

巴豆

去油
一分

麝香

錢一

右為末煉蜜為丸如菰豆大米飲下五九至十九食

前服一方壯人五丸弱人三丸

驚甲散 治肥氣在左脇下按之堅不能食脈復弦而

緊肌體痿瘦

驚甲

一兩半醋塗炙
今黃去裙襴

大黃

一兩剉
碎微炒

當歸

一兩剉
微炒

荆

三稜

一兩
炮剉

訶梨勒皮

一兩
微黃去瓢

枳殼

半兩
微黃去瓢

吳茱萸

半兩

湯浸七
次焙黃

桃仁

一兩湯浸去皮尖
雙仁麩炒微黃

右為散每服三錢水一中盞生薑半分煎六分去滓
食後稍熱服

牽牛煎丸 治肥氣結聚不散腹脇脹滿嘔逆酸水飲

食減少

牽牛子末

三兩以生薑汁半斤酒一升慢火熬如膏

木香 附子

一兩炮製

去皮

鯨甲

一兩半醋塗炙令黃去裙攔

枳擲

一兩桃仁

一兩半湯浸去皮尖

雙仁麩炒微黃細研

吳茱萸

半兩湯浸七遍焙乾微炒

硼砂

一兩不夾石者細研入

右為細末入牽牛子煎和鎔為丸如桐子大每服二

十九食前生薑湯送下

肥氣丸

治肝之積在左脇下如覆杯有頭足如龜驚

狀久不愈發嘔逆痰瘡連歲月不已其脈弦而細

青皮

炒二兩

當歸

鬚

蒼朮

各一兩

蛇含石

殼醋淬三分

蓬朮

切

三稜

切

鐵孕粉

各三兩與三稜蒼朮同入醋煮一伏

右為末醋煮米糊丸如菉豆大每服四十九當歸浸

酒下

蓬朮根散

治肥氣在脇下似覆杯咽酸嘔水面目痿

黃胃膈不利

蓬蘽根

二兩 剉

牡丹

一兩

枳殼

三分 熬炒 微黃去瓢

赤芍藥

一兩 桂

心

三 分 栝榔

一兩

荆三稜

一兩 炮裂

右為散每服三錢水一中盞煎至六分去粗食前稍

熱服

石韋丸

出聖濟 總錄

治肝積氣

石韋

拭去 毛焙

荆三稜

煨 剉

附子

炮裂去 皮臍

吳茱萸

水洗七 遍焙乾

炒陳橘皮

湯浸去 白焙

蜀椒

揀去 炒出汗各一兩

右為末煉蜜為丸如梧桐子大空腹煎荊芥湯下二

十九

大黃丸

出聖惠方

治肥氣結聚在左脇下堅牢疼痛食少體

瘦

大黃

二兩剉碎微炒

防葵

一兩

木香

三分

乾薑

三分剉

川烏頭

一兩炮裂

鯢甲

一兩半醋炙令黃剉

去皮臍

右為細末以陳米醋三斤熬令稠入神麴末半兩煮

成火鎔和諸藥為丸如梧桐子大每日空心溫酒下

二十九以微利為度

驚甲丸

出聖惠方

治肥氣體瘦無力少思飲食

驚甲

一枚約重二兩淨洗以醋和黃泥固濟背上約厚三分令乾

荆三稜

三兩炮剉

川大黃

二兩剉碎微炒枳殼

三兩麩炒微黃去瓢

木香

一兩半

桃仁

二兩

湯浸去皮將雙仁麩炒微黃細研如膏

右件藥除驚甲外搗羅為末後以泥風爐子上開口

可安得驚甲取前藥末並桃仁膏內驚甲中用好米

醋二斤時時旋放入驚甲內以慢火熬令稠取出藥

即將鰲甲淨洗去泥焙乾搗羅為末與前藥同和搗為丸如梧桐子大每日空心以溫酒服二十九晚食

前再服

三稜煎丸

出聖惠方

治腹氣固結不散脇腹急疼食少體瘦

石三稜

七斤淨洗去泥剉碎

川大黃

三兩

芫花

一兩醋拌炒令乾

木香

一兩鰲甲

三兩塗醋炙令黃去裙攔

右件藥先以水二升煮三稜至一升去滓搗羅諸藥

為末入前藥於銅器內慢火熬之更入米醋一升同

煎熬稠後稍冷並手丸如梧桐子大每日空心以溫

酒下十九

礪砂煎丸

出聖惠方

治肥氣積年不散在左脇下狀如覆杯

天陰即疼痛

礪砂

二兩不夾石者細研以酒醋各一斤熬如膏

乾漆

一兩搗碎炒令烟出

防葵

一兩 川大黃 一兩

右為細末入礪砂煎中入小蒸餅和溶為丸如菉豆大每日空心溫酒下十九

木香丸

出聖惠方

治肝積肥氣結鞭不散

木香

剉一兩

大黃

剉二兩

鱉甲

去裙襖

剉二兩

米醋三斤

與大黃同煎

醋淨為

乾度焙

右為末酒煮糊為丸如梧桐子大每服二十九空心食前生薑湯送下

治肝積氣滯左右脇下遇病作則兩邊手足頭面昏腫

乾葛

錢一

麻黃

錢三

側子

一個

川芍

防風

枳實

芍

藥

桂心

羌活

甘草

當歸

錢各四

右咬咀生薑煎服

肝之積肥氣丸

出試效方

治積在左脇下如覆杯有頭足不

愈令人發欬逆痞瘕連歲不已

厚朴

半兩

黃連

七錢

柴胡

二兩

椒

炒出汗

川烏頭

炮去皮

一錢二

錢二

乾薑

炮半

皂角

去皮弦子

巴豆霜

五錢

白茯苓

去皮

一錢

廣茂

炮二

人參

去蘆二

甘草

炙二

昆布

二錢

半

右件除茯苓皂角巴豆霜餘為細末另碾茯苓皂角細末和勻另碾巴豆霜旋旋入末和勻煉蜜為丸如

梧桐子大初服二九一日加一九二日加二九漸漸
加至大便微溏再加兩九服周而復始如積減大半
勿服春夏依此法服秋冬另有加減法在各條下秋
冬加厚朴半兩通前一兩減黃連一錢半若治風癩
於一料中加人參茯苓菖蒲各三錢黃連祇依春夏
用七錢雖秋冬不減空心淡醋湯下

伏梁附論

內經謂病有小腹脹上下左右皆有根名曰伏梁裏有

膿血居腸胃之外不可攻治之每切按之欲死又曰人有身體脾股胛皆腫環臍而痛病名伏梁此風根也夫氣之所聚名曰聚氣之所積名曰積夫聚者陽氣也故無所留止積陰氣也故有形伏梁心之積也起於臍下故小腹痛上下左右皆有根裏有膿血居腸胃之外故環臍而痛此風水之病故身體脾胛皆腫名曰伏梁以其若梁之隱伏也其症有淺深居臍上為逆以邪氣之逆上行也居臍下為從以邪之順下行也治法不可動

動之為溺墻之病故治在刺法中 夫心之積名曰伏梁

起於臍大如臂上至心下以秋庚辛得之何以言之腎
病傳心心當傳肺肺以秋適王王者不受邪心欲復還
腎腎不肯受故留結為積故知伏梁以秋得之也千金
方云經絡受病入於腸胃五臟積聚發伏梁息賁肥氣
痞氣奔豚積聚始生至期已成奈何曰積之始生得寒
乃生厥止乃成積人之善病腸中積者何以候之曰皮
薄而至澤肉不堅而淖澤如餓則腸胃受惡惡則邪氣

留則積聚乃生則腸胃之積寒溫不次和氣消止至其
玄積留止不聚乃起病有身體腰脾股胕皆腫環臍而
痛是為何病曰病名伏梁此風根也不動動之為水溺
墻之病小腹痛左右上下皆有根者伏梁也裏膿血居
腸胃之外不可攻治之每切按之欲死以下則因陰必
下膿血上則迫胃管王永生云當臍出膈腠胃管內癰
以久病也難療居臍上為逆慎勿動亟奪其氣益於大
腸而着於育育原在臍下故環臍而痛

方

訶梨勒九

出聖濟總錄

治憂積伏梁氣

訶梨勒

煨去核二兩

檳榔

剉三兩半

赤茯苓

去黑皮

柴胡

去苗枳

殼

去殼炒

羚羊角

銹

黃連

去骨

防葵

剉

生薑

切焙各一兩半

黃

芩

去黑心一兩

大黃

剉炒三兩半

木通

剉一分一兩

右為末煉蜜和丸梧桐子大每服十九空腹米湯下

日再漸加至三十丸以利為度

療痞結瘕癖氣積橫梗伏梁

右以鯉魚作膾以濃蒜齏食之昔患瘰癧者常夢人
教每日三顆大蒜初時依遂至瞑眩而愈

半夏散

出聖惠方

治伏梁氣心下硬結滿悶不能食胃背疼

痛

半夏

一兩半湯浸七遍去

川大黃

一兩剉碎微炒

桂心

一兩 前胡

去蘆頭

荆三稜

一兩剉

當歸

一兩剉焙微黃

青橘皮

一兩浸去白瓢焙

鱉甲

一兩半醋塗炙令黃去裙襖

栴榔

訶梨勒皮

木香

各一兩

右為散每服三錢水一中盞生薑半分煎至六分去

滓不拘時候稍熱服

丹砂九

出聖濟
總錄

治伏梁氣胃中痞痛小便赤澀及驚悸

不安夜多夢寐

丹砂 金邪

馬牙硝

以上三味
同研細

人參

赤茯苓

去黑皮 麥門冬

去心焙

升麻

遠志

去心一兩

生薑

乾地

黃

焙二兩 豉

一兩

右除研者搗羅為末將研者拌勻煉蜜和丸如梧桐

子大每服二十九臨卧煎桑根白皮葱湯下

川烏頭丸

出聖惠方

治伏梁氣結固在心下橫大如臂飲食

漸少肢體消瘦

川烏頭

半兩炮裂去皮臍

莞花

半兩醋拌炒令乾

荆三稜

半兩剉醋拌炒

桂心

防葵

各半兩

鱉甲

一兩塗醋炙令黃去裙襖

乾漆

半兩剉碎炒令

烟出木香

一兩半礪砂

一兩半不炙石者細研

川大黃

二兩剉碎醋拌微炒

右為細末先以米醋三斤熬令稍稠入少麴作糊和

鎔搗三百杵為丸如菴豆大每服空心以溫酒下七

丸漸加至十九以取下積滯物為度隔兩日再服

驚甲湯

出宣明論

治伏梁積氣心下如臂痞痛不消小便不

利

驚甲

去裙襴醋炙黃

荊三稜

剉

大腹

剉

芍藥

各一兩

當歸

焙切

右麤搗篩每服三錢水一盞木香末半錢同煎至七分去滓空心溫服日再服

防葵散

出聖惠方

治伏梁氣在臍上心下固結如梁之狀胃

膈不利飲食減少

防葵

荆三稜

裂炮

桂心

赤芍藥

各一兩

鱉甲

半塗

醋炙令黃
去裙襴

當歸

一兩

訶梨勒皮

一兩

川大黃

一兩到
碎微炒

枳

殼

三分麩炒
微黃去瓢

右為散每服三錢水一鍾生薑半分煎至六分去滓

食前熱服

乾漆丸

出聖
患方

治伏梁氣在心下堅牢不散胃中連背多痛

乾漆

一兩搗碎
炒令烟出

川烏頭

半兩去皮臍到
碎研半炒黃色

芫花

一兩
剉拌

炒令
黃

桃仁

半兩湯浸去皮尖
雙仁麩炒微黃

雄黃

一分
細研

鱉甲

一兩
塗醋

炙令黃
去襴攤

木香

半兩

礪砂

一兩不夾石者細

麝香

一分細研

右為細末入研前藥令勻以醋煮麵糊為丸如菉豆大每服食前以溫酒送十九

治奔豚伏梁氣

陳皮 青皮 當歸 白芍藥 薑根 梔子

甘草

各一兩

川山甲

右為麤末每服半兩水二盞生薑三片煎至八分去

粗溫服

礪砂煎丸

出聖惠方

治伏梁氣久積在心下橫大如臂發欬

疼痛胃背拘澁腹脇滿悶

礪砂

二兩不夾石者細研以酒醋各半斤熬如膏

乾薑

半兩炮製到

附子

一兩

炮裂剉去皮臍

栝榔

一兩

川大黃

二兩剉碎微炒

右為細末入礪砂煎更入蒸餅少許和鎔為丸如梧

桐子大每服空心溫酒下十五丸至二十九丸

大黃煎丸

出聖惠方

治伏梁氣心胃妨實背膊煩疼不能食

四肢無力

川大黃

三兩到研微炒別離搗末以酒醋各一升熬如膏

木香

一兩荆三稜

一兩到碎醋拌炒令乾

桃仁

一兩湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃

訶黎勒皮

一兩

桂心

檳榔

青橘皮

各一兩湯浸去白瓢焙

右為細末入大黃煎更入蒸餅少許和鎔為丸如梧

桐子大每日空心溫酒下十九至十五丸

伏梁丸

出三因方

治心之積起於臍上上至心大如臂久久

不愈病煩心身體重股背腫環臍而痛其脈沉而芤

茯苓

厚朴

薑汁製炒

人參

枳殼

麩炒去瓢

白朮

半夏

湯洗 七次 三稜 慢火煨熟 乘熱溫製

右等分為末煮糊丸如梧桐子大米飲下二十九食
前日兩服作散酒調服絕勝

氣塊石燕散

指出直方

治飲食傷冷心下結塊狀如伏梁又

攻左脇

車螯殼

蛤蜊殼

並燒灰存性 為末各一兩

乾薑

生

官桂

甘

草

各灸一兩

右為末每服二錢臨發時沸湯點服車螯蛤蜊殼治

塊

伏梁九

出指南方

臍下如臂時起至心下又或身體肢脛皆

腫始由腎病傳心心傳肺肺乘王不受邪氣留於心
結而為積其脈大而時一結或沉而扎謂之伏梁其
病裏有膿血居腸胃之外按之欲死比下則因陰必
下膿血上則追胃腕內癰居臍上為逆居臍下為從
始萌可治久則難以變成水

青皮

白馬尿浸三日
今軟透切三兩

巴豆

去皮十五個與青皮
同炒乾去巴豆不用

羗

活

半兩

右為末糊為丸如菉豆大米飲下十五丸未知加至

十九

治伏梁氣橫在心下不能飲食

出聖惠方

木香

一兩 礪砂

一兩 夾石者細研入

川大黃

二兩 剉碎措拌炒令乾

右為細末入研過礪砂令勻以酒煮麵糊為丸如梧

桐子大每服食前生薑湯下七丸

治伏梁氣在心下結聚不散

出聖惠方

硝石 半兩 牽牛子 一兩 木香 半兩

右為細末以米醋二斤內藥末慢火煎令稠入少麵糊和鎔為丸如桐子大每服空心溫酒下十九

治伏梁氣方

右白馬尿銅器中盛取每旦服一斤

治伏梁氣在心下結聚不散

出聖惠方

右以桃奴三兩為末空心溫酒調二錢服

人參丸 治心積伏梁

人參

一兩

陳橘皮

湯浸

去白

焙

二兩

射干

一斤煎膏

射干

自然銅

自然銅

自然銅

自然銅

自然銅

自然銅

自然銅

自然銅

自然銅

研如粉

研如粉

研如粉

研如粉

研如粉

研如粉

研如粉

研如粉

研如粉

研如粉

研如粉

研如粉

研如粉

研如粉

研如粉

研如粉

研如粉

研如粉

研如粉

研如粉

研如粉

研如粉

研如粉

研如粉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

驚甲

一兩半 塗醋炙
炮令黃去裙攔

吳茱萸

半兩 湯浸七
遍焙乾微炒

郁李仁

一兩 湯浸
去皮焙炒

荆三稜

一兩
炮剉

枳實

三分 麩
炒微黃

柴胡

三分
去苗桂

心

三
分 栴榔
一兩

右件藥搗篩為散每服四錢水一中盞入薑半分煎

至六分去滓食前稍熱服

心之積痰苓丸

出試
効方

起臍上大如臂上至心不愈令人

煩心

黃連

鬚一
兩半

厚朴

去皮薑
製半兩

人參

去蘆桂
五錢

乾薑

去皮
一錢 炮

錢
茯神

去皮末
一錢

丹參

炒一錢

右件除巴豆霜外為細末另研巴豆霜旋旋入末煉
蜜為丸如梧桐子大初服二丸每日加一九二日加
二丸漸加至大便秘澀再從兩丸加服淡黃連湯送下
食遠過而復始積減大半勿服秋冬加厚朴半兩通
前稱一兩減黃連半兩即用一兩黃芩

治心下結伏氣

用甘藍

平

煮作蘗經宿浸色黃和鹽食之

痞氣 附論

凡積氣在胃脘腹大如盤者脾積也痞結不通故名痞氣此本肝病傳脾脾當傳腎腎以冬適王而不受邪氣留於脾故結為積以冬壬癸日得之久不愈令人四肢不收發黃疸飲食不能肌膚所以然者脾藏肌肉之氣能與胃行其津液以榮養四肢若為積氣所留不能榮養故有四肢不收飲食不為肥膚之症

方

麴朮香稜丸

德生堂方

治男子婦人小兒脾積氣滯胃膈痞

悶肚腹脹滿痞痞氣塊往來走注刺痛大傷酒食嘔吐酸水飲食不思婦人血氣癥瘕小兒脾滯並皆治之此方比瑞竹堂方略有加味

荊三稜

莪朮

陳皮

香附子

各四兩作一處用好醋二斤煮

一伏時去醋焙乾

白豆蔻

沉香

硝砂仁

萆澄茄

木香

川薑

烏藥

各二兩

枳殼

炒

檳榔

乾葛

半夏

炒

神麴

乾葛花

二兩

右為末熬蘿蔔水煮糊為丸如菉豆大每服五七十
九隨意酒生薑湯下

金露紫苑丸

出宣
明論

治一切脾積兩脇虛脹臍腹疼痛

草烏頭

去皮
火生

黃連

半兩

官桂

桔梗

乾地黄

乾

生薑

川椒

蕪荑

紫苑

去皮

柴胡

防風

厚

朴

甘草

人參

川芎

鱉甲

酒浸

貝母

枳殼

甘遂

以上各
一兩

巴豆

三兩醋煎
半日出油

礞砂

三錢

右為末水煮麵糊為丸如梧桐子大每服五丸空心

臨卧米湯下或微疎動詳虛實加減

消痞九

一名大消痞九
出衛生寶鑑

治一切心下痞悶及積年久不

愈者

黃連

去鬚煉
炒六錢

黃芩

刮黃色
六錢

薑黃

白朮

各一兩

乾生

薑甘草

炙三錢

硝砂仁

三錢

枳實

炒黃
五錢

橘皮

四錢

參

四錢

半夏

湯洗七次四錢

神麴

炒黃色
二錢

厚朴

三錢

猪苓

二錢半

一方加澤瀉

右為細末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服五十九

至七十九一百九白湯送下食後一方無人參甘草

蒜紅丸

出百一選方

治脾積腹脹如鼓青筋浮起坐卧不得

者

揀丁香

木香

沉香

栝榔

青皮

去白

陳皮

去白

硝砂仁

蓬莪茂

炮去皮

青皮

去白

牽牛

草薺子

各一兩

肉豆蔻

麩煨

粉霜

各一兩

白茯苓

去黑皮

人參

各半兩

蒜

二百枚一半生用一半火焙熟

右為細末以生熟蒜研細生細絹取汁旋用末藥為

九如梧桐子大每服五七丸至十五丸食後淡鹽湯送下忌醃酸魚鮓茶醬醃藏雞鴨生冷馬牛雜肉之類只喫淡白粥一百日

金液丸

出聖濟總錄

治脾積痞氣痰逆惡心腹脇滿悶胃膈

噎塞不思飲食

荆三稜

炮

蓬莪茂

炮

白朮

丁香皮

刮去麁皮

牽牛子

麁炒

青橘皮

陳橘皮

並湯浸去白焙

肉豆蔻

大者去殼

栝榔

內一

乾薑

炮

礞砂

研各半兩

丁香

巴豆

半兩皮研如膏

和皮稱去壓

油去盡以不
汚紙為度

右為末攪拌勻用頭醋煮稠麵糊為丸如菉豆大每
服五丸食後米湯飲下

萬安丸

出仁
存方

治腹中成形作塊按之不移推之不動動

輒微喘令人寒熱腹中時痛漸漸羸瘦久不治者多
變成水虛腫亦由憂思驚恐寒熱得之陰陽痞瘕氣
結成形其脈結澁謂之積氣

大戟

炮

甘遂

牽牛

半生
半炒

五靈脂

吳茱萸

浸七
次炒

玄胡索

炒各二錢半

芫花

醋煮

石膏

各一錢

膽礬

半錢

細

墨

燒半錢

斑蝥

十個去頭足炒

芫菁

二十枚去足炒

巴豆

去油半錢

右為末糊丸菴豆大薑橘皮湯下三粒日二服病去

五六分即住服

快氣丸

出聖濟總錄

治脾積痞氣心腹脹滿嘔逆噫酸

楫榔

三枚剉

木香

一兩

肉豆蔻

去殼半兩

甘遂

半兩麩炒黃

大戟

一分炮

白牽牛

一兩炒

墨

一分

沉香

半兩

陳橘皮

湯浸去白焙

右為末白麵糊為丸食後生薑湯下

消痞丸

治一切痞氣心腹脹滿癖氣聚滯不快

青皮

去白

陳皮

去白

荆三稜

炮切

廣茂

煨切

益智

炒

硝砂仁

當歸

切焙

半夏

薑製

牽牛

炒

丁香皮

一兩

礞砂

明者一

分另研

右為細末酒糊為丸如小菉豆大每服二十九生薑

湯送下不拘時服

沉香消痞丸

沉香

半兩

木香

半兩

陳皮

兩

青皮

兩

三稜

兩

蓬朮

兩

砂

仁

香附

烏藥

枳榔

乾薑

各一兩

兩

右為細末醋糊為丸梧桐子大每服五六十丸用米

飲湯送下食前服

豆蔻丸

出聖濟
總錄

治脾積痞氣攻注腰背痛

肉豆蔻

去殼

赤茯苓

去黑皮

高良薑

附子

炮裂去
皮臍

草

豆蔻

去皮

藿香

陳橘皮

洗浸去白
焙各二兩

人參

兩一枚
榔十個

桂

去麤皮
半兩

右剉如麻豆大每服二錢水一盞半入棗五枚生薑一分切碎煎至八分去滓熱服

勻氣湯

出聖濟總錄

治脾積痞氣胃脘不安肌瘦減食

大腹

兩枚連皮剉

牽牛子

一兩半生半熟

高良薑

炮半兩

白朮

陳麴

炒

桂

去籠皮

麥蘖

炒各一兩

郁李仁

半生半熟

厚朴

去籠皮薑

汁各一兩

甘草

炮二兩

右麴搗篩久服三錢水一盞生薑三片

缺

一枚擘

同煎至七分去滓稍熱服日三

調中順氣丸

出衛生寶鑑

治三焦痞滯水飲停積脇下虛滿

或時刺痛

木香

兩一

白豆蔻

去殼一兩

青皮

炒一兩

荊三稜

炮一兩

半夏

湯炮七次二兩

硝砂

去殼半兩

枳榔

半兩

陳皮

半兩

大腹子

二兩

右為細末煮麵糊為丸如梧桐子大每服三十九漸加至六十九食後陳皮湯下

勝紅丸

出瑞竹堂方

治心腹痞滿消食快氣美進飲食

三稜

醋炙

廣茂

醋炙

青皮

去瓢炒

陳皮

去白

乾薑

炮火

良薑

蘿蔔子

炒各一兩別研

香附子

二兩炒去毛

枳實

去瓢炒一兩

白朮

煨一兩

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服五七十九薑湯或木香湯煎陳皮湯送下不拘時候

三脘痞氣丸

木香 青皮 三稜 砂仁 檳榔 白豆蔻

沉香 等分

右為末薑糊為丸如梧桐子大每服三四十九食前薑湯米飲下

訶梨勒散

出聖惠方

治痞氣結聚在胃管心腹妨不能飲食

訶梨勒皮

一兩半

鱉甲 一兩半 塗醋炙

白朮 一兩

人參 去蘆

頭三桂心

三分

防葵 三分

川大黃 三分 剉碎微炒

郁李仁 三分

湯浸

去皮微炒

甘草

半兩 炙

右為散每服三錢水一盞生薑半分煎至六分去滓

食前稍熱服

栝榔散

出聖惠方

治痞氣心腹脹硬飲食不下

栝榔

一兩

牽牛子

一兩

木香

半兩

白朮

三分

陳橘皮

半兩

湯浸去白

炒

高良薑

半兩

訶梨勒皮

三分

枳實

半兩

炒微黃

甘草

半兩

微炒

赤 剉

右為散每服三錢水一盞煎至六分去滓食前稍熱

服

驚甲散

出聖惠方

治痞氣結聚在胃管盤牢不動飲食漸少

四肢無力

驚甲

一兩半塗醋炙今黃去裙襴

川大黃

一兩半剉碎微炒

木香一兩草

豆蔻

三分去皮枳殼

三分麩炒微黃去瓢

郁李仁

一兩湯浸去皮微炒

荆三

稜

一兩炮剉

當歸

一兩

檳榔

一兩

右為散每服三錢水一中盞生薑半分煎至六分去

滓食前稍熱服

三稜丸

出聖惠方

治痞氣在胃管狀如覆杯心腹脹滿不能

飲食肌體漸瘦

荆三稜

二兩剉碎醋拌炒令乾

訶梨勒皮

一兩 川大黃

二兩剉碎微炒

鱉甲

一兩半塗醋炙令黃去裙襴

木香

一兩搗碎炒令烟出

栝榔

一 桃仁

一兩湯浸去皮尖雙仁麤炒微黃

川烏頭

一兩去皮臍剉碎鹽拌炒令黃

右為細末取米醋三斤煎成膏入蒸餅和鎔為丸如

梧桐子大每日空心溫酒下二十丸

脾積丸

出聖濟總錄

治脾積痞氣身黃口乾胃膈滿悶肌瘦

減食或時壯熱

陳倉米

一合醋浸淘過

青橘皮

五十片醋浸軟去白

巴豆

五十枚去皮麻絲繫

定三分同炒乾去巴豆不用入後藥

石三稜

一分雞爪三稜

一分蓬莪茂

三枚炮剉

荆三稜

一分炮剉

栝榔

二枚剉

右為末取一半麵糊為末如菉豆大一半作散每服

一錢白粥飲調下三丸

異香散

指出方

治脇膨脹痞滿噎塞噎氣吞酸一切風痞

腰脇刺痛

蓬朮

益智

甘草

三稜

錢各六

青皮

錢三

陳皮

錢三

石連

厚朴

錢各一

右咬咀水二盞入薑棗鹽少許煎服或鹽湯點或鹽

酒調皆可

平氣丸

出聖濟總錄

治脾積痞腹脇膨脹心痛胃悶不思飲

食

檳榔

一枚

烏梅

核一兩一半去

荊三稜

炮半

青橘皮

去白焙

一兩

硝砂

去皮

胡椒

半兩

巴豆

去皮心別
研二錢

右將六味搗羅為末入巴豆研勻白麵糊為丸如棗

豆大每服三丸食後溫酒薑下

白朮湯

出聖濟
總錄

治痞氣脇滿悶

白朮

柴胡

去苗

生薑

去皮薄切炒乾

桂

厚朴

去麋皮與桂各三兩

塗生薑汁

炙香熟

甘草

炙剉一兩

檳榔

剉十片

右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服微

利為度

氣積方

沉香

木香

砂仁

輕粉

各三兩

牛腦子

一個用
好酒浸

一宿去
筋膜

公雞肫

連皮黃

皮硝

一
碗

右牛腦子同雞肫好酒浸一宿後入沉香砂仁皮硝
杵千下用生銅鍋文武火炒乾研為末後入輕粉每
服一匕二錢空心燒酒服日進三服為妙

烏頭丸

出聖濟
總錄

治脾積痞氣胃脇脹滿氣逆昏悶四肢

少力

烏頭

炮裂去皮臍

半夏

湯浸去白焙乾各一兩

防風

去

乾薑

炮

枳

實

去瓢麩炒

皂莢

去皮子醋炙

木香

各一兩

右為末生薑自然汁為丸如小菴豆大早晚用炒生

薑湯下七丸至十九不可多服

紅丸子

治丈夫脾積氣滯胃膈滿悶面黃腹脹四肢

無力酒積不食乾嘔不止背脾連心胃及兩乳痛婦

人脾血積氣諸般血癥氣塊及小兒食積羸瘦面黃

肚脹氣急不嗜飲食漸成脾癆不拘老少普宜服之
壯胃消宿食治冷瘧霍亂

荊三稜

浸軟切片

蓬莪茂

青橘皮

陳皮

去白各五斤

乾

薑

炮

胡椒

各三斤

右為細末用醋麵糊為丸如梧桐子大礬紅為衣每
服三十粒食後薑湯下小兒臨時加減與服一方有
阿魏四兩醋浸入糊同丸治大人小兒脾胃等患極
有神效但荊三稜蓬莪茂本能破癥消癖其性猛烈

人不以此為常服之劑然今之所用者以出產之處
隔絕二藥不得其真乃以紅蒲根之類代之性雖相
近而功不同以之治病不能傷耗真氣瘦人虛人小
兒妊婦皆可服之無疑但修合之際務在蒸治用好
米醋煮陳米粉為丸仍去阿魏礬紅最宜常服飲食
所傷中脘痞滿服之應手而愈大病之後穀食難化
及治中脘停酸並用薑湯嚥下脾寒瘡疾生薑橘皮
湯下心腹脹滿紫蘇橘皮湯下脾痛作楚菖蒲湯下

酒疸穀疸遍身皆黃大麥湯下兩脇引乳作痛沉香
湯下酒積面黃腹脹時或乾嘔煨薑湯下婦人脾血
作痛及血癥氣瘕並經血不調或過時來或發為寒
熱並用醋湯下男子婦人有癰瘤之患辰砂為衣此
藥用橘葉湯下妊婦惡阻嘔出納食百藥不療惟此
藥最妙仍佐以二陳湯五膈寬中散服之但人疑丸
子不利胎氣未必信服當易名用之特有奇效然恐
妊婦服此之後偶爾傷動必致歸咎故不敢極言其

妙耳

驚甲丸

出聖惠方

治痞氣當胃脘結聚如杯積久不散腹脇

疼痛體瘦成癆不能飲食

驚甲

三兩去裙襖以米醋一小盞化礪砂一兩用塗炙驚甲令醋淨為度

附子

一兩炮裂

去皮

荆三稜

一兩微炮炒

乾漆

一兩搗碎炒令烟出

木香

一兩

川大

黃

二兩剉碎醋拌炒令乾

吳茱萸

半兩湯浸七遍炮乾微炒

右為細末以醋煮麴糊和鎔搗三二百杵為丸如梧

桐子大每日空心溫酒下二十丸

蕪荑丸

出聖濟
總錄

治脾積痞氣微有滑泄不思飲食

蕪荑

四兩

陳橘皮

湯浸去白焙乾四兩為末米醋一斤

附子

炮裂去皮
臍二兩

木香

一兩

莎草根

上毛
三兩

白朮

一兩

右除橘皮外搗羅為末入橘皮煎和鎔煉蜜為丸如梧桐子大空心用陳米飲下三十丸

牽牛子丸

出聖
惠方

治脾積痞氣大便不通身腫少力肢節

疼痛兼治心腹脹硬臟腑壅滯

牽牛子

一兩半
微炒

甘遂

半兩
微炒

荆三稜

炮

木香

一兩

陳橘

皮

湯浸去白焙乾
方用青橘皮

訶梨勒

煨取皮
三分

右為末生薑汁二兩蜜四兩同煎至四兩鎔和前藥末為丸如梧桐子大臨卧米飲下二十九或生薑湯下

甘遂方

甘遂

黃芩

芒硝

桂心

細辛

各一兩

大黃

三兩

右咬咀以水八升煎取二升半分三服

痞氣丸

出三因方

治脾之積在胃管覆大如盤久不愈四肢

不收黃瘴飲食不為肌膚心痛徹背背痛徹心脈浮

大而長

大烏頭

一分去
皮炮煎

附子

半兩炮
去皮臍

赤石脂

煨醋
碎

川椒

炒
出

汗

乾薑

炮各
二兩

桂心

半兩

右為末蜜丸如桐子大硃砂為衣每服五七丸米湯

下漸加至十九

白朮丸

治積聚癖氣不能飲食心肋下滿四肢骨節

酸疼盜汗不絕

白朮

黃耆

剉

人參

赤茯苓

去黑皮

烏頭

炮裂去皮臍

乾薑

炮

當歸

切焙

甘草

炙

枳櫛

剉各兩半

牡蠣

芍藥

麥門冬

去心焙

細辛

去苗葉

前胡

去蘆頭

鱉甲

去裙襖醋炙各一兩

防葵

剉

紫苑

去苗土

桔梗

炒

桂

去粗皮各三分

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九空腹日

晚溫酒下漸加至三十九忌菹菜桃李雀肉生蔥海

藻菰菜生菜大蒜豬肉

秘方勝紅丸

出醫方大成

治丈夫脾積氣滯胃膈滿悶腹脇

四肢無力酒積不食乾嘔不止背脾連心胃及兩乳
痛婦人脾血積氣諸般血癥氣癥小兒食積骨瘦面
黃肚腸氣急不嗜飲食漸成脾癰

陳皮 青皮 三稜

莪朮

二味同用
醋炙切片

乾薑 炮良

薑

各一兩
香附 炒去毛

右為細末醋糊為丸如桐子大每服三十九薑湯下
一方加神麴麥芽 小兒量大小加減 此方即局
方紅九子去礬紅阿魏胡椒增良薑香附子極為穩

當應老人虛人妊婦小兒服之無疑以其治病有功
不能傷耗真氣尋常飲食所傷中脘痞滿服之應手
而愈大病之後穀氣難化及治中脘停酸功效特異
脾寒瘡疾生薑橘皮湯 心腹脹滿蘇梗橘皮湯
脾痛作楚菖蒲湯 酒疸穀疸遍身皆黃大麥煮
飲 兩脇引浮作疼磨沉香溫水 酒積食積面黃
腹脹時或乾嘔煨薑湯 婦人脾血作痛及血癥氣
瘕並經血不調或過時不至醋湯下寒熱往來尤宜

與服 產後敗血上攻心神迷亂狀若癲癇熱醋湯
下其效尤速男子婦人癲癇者未必皆由心經蓄熱
亦有因脾氣不舒致痰飲上迷心竅而成斯疾者若
伏梁過臍多愈見昏亂宜用此藥衣以硃砂用橘皮
葉湯下名小鎮心丸

化鐵散 治痞積

威靈仙

楮桃兒

各一兩

右為細末每服三錢用溫酒調下

寬膈丸 療氣不升胃膈痞結

木香

荊三稜

煨

青橘皮

去白各半兩

半夏

二兩湯洗七次

大

腹子

三錢半

右為細末生薑汁麵糊為丸如梧桐子大每服七十

丸食後生薑湯下

桂花散

出直指方

治脾積氣痛

香附

五兩炒去毛

蓬朮

醋煮焙

良薑

桂花

甘草

炙各一兩

右為末每服二錢空心沸湯鹽點服

半夏湯

出聖濟總錄

治脾積冷氣痞結胃滿痰逆四肢怠惰

半夏

陳皮湯去滑焙乾

葶藶

紙上炒各一兩

麥門冬

去心焙乾二兩

蘆根

剉碎
三兩

右粗搗篩每服三錢水一盞入小麥淘淨半合生薑

半棗大切同煎至八分去滓空心日午夜卧各一服

如病人瘦弱即加桂心栝子仁各一兩

礬石丸

治脾積痞氣泄瀉日夜下痢白膿

礬石

燒冷汁枯

訶梨勒

煨去核各二兩

黃連

去鬚三兩

木香

一兩

右為末水浸蒸餅濾如糊為丸如梧桐子大空心食
前陳米飲下二十九丸以泄止為度

金露丸

出保命集

治脾積內傷心下痞不降米穀不化

大黃

二兩

枳實

半兩炒

桔梗

二兩

牽牛

頭末二錢半

右為細末薑糊為丸蒸餅亦得丸梧桐子大溫水下
二三十丸

金真丸

治三焦氣壅結痞心胃大便秘不通傷寒下症

已服承氣不利服此百粒安穩而通

川大黃

商枳實

炒 麴

枳榔

黑牽牛

各等分 一半生 一半熟

右為細末滴水為丸如梧桐子大每服五七十九丸
飲下以大便和利為度去枳榔枳實倍加黃芩滑石
名藏用丸治心腹大痛脹滿大小便不通潮熱燥渴
服緊峻藥必吐了服五七十九丸至百丸必通服藥過
多肛門下燥結不得便即用提盆散導之

硫黃丸

出聖惠方

治痞氣結固不散心腹疼痛食少體瘦

硫黃

二兩細研水飛過

木香

一兩半為末

川大黃

二兩剉碎微炒為末

桃

仁

四十九枚湯浸去
度尖雙仁別研

右藥四味先取大黃末用酒洒濕納新竹篋子內開
口入炊飯甑中蒸令飯熟為度取出與桃仁同研極
爛入硫黃末研勻入少許麵糊和為丸如梧桐子大
每日空腹以酒下二十丸

治脾積氣痛婦人諸般氣痛

出聖
惠方

香附子

五兩炒去
毛赤色止

莢木

醋煮甘草
各二兩

右為細末每服二錢入鹽少許百沸湯點空心熱服

又方

出本
事方

良薑

四兩

甘草

一兩

桂心

半兩

右為末每服一錢入鹽沸湯點服

木香丸

出聖
惠方

治痞氣心腹堅脹飲食不消

木香

一兩

川大黃

二兩

剉碎醋
拌今炒乾

硫黃

一兩

研細
水飛過

右為細末研入硫黃令勻以酒煮麵糊和丸如梧桐

子大每服空心生薑湯下十丸

治男子婦人腹痞病脾積大有神效

蒸餅

先用發酵者五六個陰三宿擘碎晒乾為細末

皮硝

一斤為細末

黃沙

牛腦子

一個鮮者去了腦皮紅筋指細用粗濾過入硝末和丸

右一處和勻酵麵糊為丸如梧桐子大每服二十丸
空心好酒送下日進三服忌食生冷物雞猪肉酢韭
豆麵麩青菜忌一百日有效驗矣

治痞疾

信砒

二兩別研如粉

寒水石

三兩別搗為末

右用生鐵銚子先鋪石末後堆砒末在上以石末蓋

頭然後盛蓋之用麵醋紙條子密封約十重以炭火
一斤以來銚子在候紙條子黑取出置冷地上候冷
取開之揀淨刮取砒石末一處入乳鉢內細研以軟
粟米飯和丸如梧桐子大更別搓小丸一等以備小
兒服以飛過辰砂為衣候乾磁瓦合收每日服時於
發日早以茶清下一丸一日内不得喫熱物合時先
掃灑一淨室中合之不得令婦人猫犬雞鼠等見收
得時亦然若婦人患則男著在口中男子亦然

治夏秋之交露夜坐久痞如羣石在腹

生大豆

升半

生薑

八分

右以水二升

關

頓服瘥

治飲食過度不消成痞

馬牙硝

兩一

吳茱萸

斤半

石用水濃煎汁服愈實羣在常州此方得效

通膈丸

一名道間散
出御藥院方

治胃中痞氣不通水飲停滯

枳榔

三兩

枳實

四兩

炒

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十九至五十九食後生薑湯下溫水亦得一方作散

五積丹

出宣明論

治心腹痞滿嘔吐不止破積聚者

皂莢一鈹

一尺二寸火燒存性磁盆合之四面土壅勿令烟出

巴豆

十二個白麴一

兩二錢同巴豆炒令麴黃為度

右末醋糊為丸如菉豆大每服十九鹽湯食後加減服

治大人小兒痞症脾疾絕妙

白礬

一兩為末
重羅生用

雞冠雄黃

二錢為極細
末重羅生用

右先用白麵一匙用井花涼水不要調稀後入煎藥
一處調成膏子須要攪至一二千遍務使勻調看疾
大小用厚紙攤藥一錢厚貼於患處用糲粉絹帛縛
定如乾用涼水輕掃次日藥窩樣封時三日換前藥
三遍利白膿即瘥此方大有神效不可盡述忌犯鐵
器

治痞氣心腹堅脹飲食不消

訶梨勒

一兩半塗醋炙
今黃去裙襖

右為粗散每服二錢食前生薑橘皮煎湯調下

治脾方

右以一淨紙心內畫一十字灸三倍擲七遍此方有
神效

治脾痞塊積

闕此藥名為透脾膏不用爐火不煎熬甘遂各等分
礪砂木鱉不相饒皂莢穿山火炮過杏仁商陸等體

高慈白七根並沙蜜將來一處搗成膏貼在脾上連磨轉有似神仙用手搥

別脾散

治痞症發熱盜汗胃背疼痛

右以甘遂不拘多少用麪包於漿內煮十數沸去麪後將細米糠火炒黃色為末大人每服三錢小兒一錢忌諸等肉用冷蜜水卧服忌油膩濕麪腥物

大黃丸

治五臟積聚癖氣或有墜損腹滿

大黃

剉炒

檳榔

剉炒

桃仁

去皮尖雙仁炒

研如膏各三兩

鰲甲

醋炙

去裙襖

關

荆三稜

剉

乾薑

炮

烏頭

炮

裂去皮
臍各三兩

桂

去粗皮

粗

吳茱萸

陳者湯浸炒

乾各一兩

右搗羅八味為末與桃膏研勻以蜜丸如桐子大每服三十九空腹日午夜煎橘皮湯各一服一方用醋煮麵糊為丸生薑湯溫酒下亦得

厚朴丸

治痞氣積年瘕結聚在於胃管大如覆杯心

腹脹痛食少無力

厚朴

一兩半去粗皮塗薑汁炙令熟

木香

一兩

枳榔

半

兩

青橘皮

一兩湯浸
去白瓢焙

川大黃

一兩到碎醋
拌炒令乾

硫黃

一兩細研
水飛過

右為細末入研過硫黃令勻以酒煮麵糊和丸如梧
桐子大每服食前生薑湯下十丸

礞砂煎丸 治痞氣積聚不散心腹疼痛

礞砂

一兩不炙
石省細研

莞花

一兩醋拌
炒令乾

荆三稜

一兩微
煨炒

鰲

甲

一兩塗醋炙
令黃去裙闌

川烏頭

去皮臍半兩到
研鹽拌炒令黃

右藥除礞砂外研羅細末先以米醋一升慢火熬礞
砂次下諸藥同熬令稠入小蒸餅和鎔為丸如菉豆

大每服食前生薑湯下十九

葛根丸 治脾積痞氣煩渴口乾

薏苡根

劉

葛根

劉

附子

炮裂去

皮臍

蘆根

劉

各

一兩

糯米

合

右為末入桃膠湯浸煮為糊和丸如小豆大食後臨
卧燈心杳杞葉煎湯下十九至二十九

木香枳榔煎 治脾積 塊腹脇走痛口吐清水

木香

一

枳榔

七枚

乾漆

半兩

炒

今烟盡

礞砂

半兩

別研

肉桂

度

去

一 肉豆蔻

五枚

胡椒

四十九

粒炒

右為末次入礪砂和勻煉蜜為丸如梧桐子大每服
七丸橘皮湯下

取積丸

硃砂

雄黃

輕粉

各三錢

礪砂

川烏

九錢

巴豆

一兩

五錢
去油

白麵

一兩
五錢

右為末醋糊丸如梧桐子大薑湯下

鐵刷湯

治男子脾積氣痛婦人血氣刺痛及治中酒

惡心一切瘡痢氣疾腸風下血臟毒滑腸泄瀉

蒼朮

八兩米泔
浸一宿

良薑

六兩半
炒炙

茴香

二兩
炒

右為細末每服二錢生薑三片鹽一捻水一盞煎至七分酒服熱湯調下亦得如脾寒用酒一盞煎臨發時連進三服兼治四方人不伏水土小兒臟寒脫肛並用薑三片棗子一枚煎如胃暑伏熱擣生薑冷水調下若行路早起棗子一個去核包藥少許同生薑三片嚼下能辟四時八節疫癘砂瘴等疾

枳實消痞丸

一名失笑散
出衛生寶鑑

治右關浮弦心下痞痞惡食

懶倦開胃進食

枳實

炒 楚

黃連

錢 各五

乾生薑

錢 一

半夏

錢 三

人參

錢 二

炙

甘草

兩 二

白朮

錢 二

白茯苓

錢 二

厚朴

錢 二

炙

麥蘖麵

錢 二

右為細末湯浸蒸餅為丸每服三十九丸溫水送下不

拘時候量虛實加減

脾之積痞氣丸

出試 效方

在胃脘腹大如盤久不愈令人四

肢不收發黃疸飲食不為肌膚

厚朴

去皮 四錢半

黃連

去鹽 八錢

吳茱萸

洗 三錢

黃芩

二錢

白茯苓

苓

去皮一錢
另為末

澤瀉

一錢另
為末

川烏頭

炮製去
皮半錢

人參

去
蘆

茵陳

酒製炒
二錢半

巴豆霜

四分
乾薑炮

一錢半

白朮

二錢

硝砂

仁

去皮一錢
半

桂

去皮
四分

川椒

炒半
錢

右除巴豆霜另研茯苓另為末旋入外同為細末煉蜜為丸如梧桐子大初服二九一日加一九二日加二九漸加至大便溏再從二九加服淡甘草湯送下食前周而復始積減大半勿服秋冬加厚朴五錢半通前一兩減黃連一錢減黃芩一錢黃疸並積大不

通透一料中加巴豆霜一分附子炮一錢砒少許

加減痞氣丸

出試效方

孟秋合治脾之積

黃芩

酒製三分

黃連

酒製三分

厚朴

錢一半

夏

錢半

益智

三分

吳茱

萸

三分紅花

半分

青皮

二分

當歸尾

二分

茯苓

二分

澤瀉

二分麴

炒二分

廣茂

二分

昆布

二分

橘皮

去白二分

熟地黃

二分

人參

二分

附子

三分

葛根

二分

甘草

炙二分

巴豆霜

二分

右為細末蒸餅為丸如梧桐子大初服二九一日加
一九二日加二九漸加至大便溏再從二九加服煎

淡甘草湯送下食前服

沉香飲子

出華陀中藏經

治痞氣升降陰陽

沉香 白茯苓 木香 羌活 獨活 人參

桑白皮 紫蘇葉

以上各等分

右咬咀為粗末每服三錢水一盞半大棗二個姜五片煎至七分去滓食前溫服二滓又作一服

枳實理中丸

出御藥院

治胃痺心下痞留氣結胃滿脇下逆

氣搶心

枳實

炒 麩

人參

去蘆 頭

乾薑

炒 一兩

甘草

炙

白朮

茯苓

去皮 各一兩

附子

炮 去皮 臍半兩

右為細末煉蜜為丸每兩作四丸每服一九水一大
蓋煎至六分 and 淳溫服不拘時候

黃連消痞丸

出試 效方

治心下痞滿壅滯不散煩熱喘促不

安

黃連

去鬚 炒 一兩

枳實

炒 七錢

橘皮

五錢

乾生薑

二錢

半夏

九錢

黃芩

炒 黃色 二兩

茯苓

三錢

白朮

三錢

炙甘草

三錢

薑

一錢

澤瀉

錢一猪苓

去黑皮
半兩

右為細末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服五十九

食遠溫水送下

人參順氣飲子

一名葶藶
出試效方

治心下痞胃中不利

苦葶藶

酒浸
炒

人參

各三錢

甘草

炙

薤活

柴胡

獨

活

各三錢

黃芩

三錢半炒
并酒製

縮砂仁

白豆蔻仁

茵

陳

酒製
各一錢

乾葛

一錢

青皮

石膏

厚朴

炒半夏
半洗

錢當歸

七分

右為細末湯浸蒸餅為丸和勻篩子內擦如米大
服三錢臨卧用白湯送下

木香化滯湯

出試效方

治因憂氣結中脘腹皮底徹痛心下

痞滿不思飲食食之不散常常痞氣

柴胡

四錢

橘皮

三錢

甘草

炙五錢

半夏

一兩

生薑

三錢

當歸尾

二錢

草豆蔻仁

五錢

木香

三錢

紅花

半錢

枳實

麩皮炒二錢

右咬咀如麻豆大每服二錢水二盞煎至一盞去渣
大溫服食遠忌酒濕麵

消痞湯

出東垣
蘭室方

治因憂氣中脘腹皮底微痛心下痞滿

不思飲食

柴胡

四兩 橘皮

三錢

炙甘草

半夏

一錢半

生薑

三分

當歸

梢紅花

二分
許少

右剉如麻豆大都作一服煎法如常忌酒濕麵

枳實丸

出楊氏
家藏方

治脾胃積寒氣不升降中脘痞悶心腹

作痛發渴不常

枳實

楚炒黃色
一兩半

陳橘皮

去白一
兩半

蘿蔔

一兩
炒

木香

半兩

人參

去蘆頭
半兩

右為細末麵糊為丸如梧桐子大每服五十丸濃煎

木瓜湯下

三稜丸 心下如盤久不已令人四肢不收發黃疸飲

食不為肌膚始由肝病傳脾脾當傳腎腎乘王而不

受邪故留於脾胃成痞氣其脈緩澁兼治食癥酒癥

血蠱血瘕氣塊時發刺痛婦人血分男子脾氣橫泄

三稜


莪朮

各四兩

芫花

二兩

右三味用米醋三斤煮令醋盡獨炒芫花令乾將二
味切片子焙乾同為末麵糊丸如豌豆大橘皮湯下
五丸以知為度



普濟方卷一百七十